



PSDTA Mesotelioma

Allegato 3 : Stadiazione TNM/AJCC (VIII edizione)

**A cura del Gruppo di Studio Mesotelioma
Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta**

Anno di pubblicazione 2023

| Classificazione | Descrizione |
|------------------------|---|
| T | Tumore primitivo |
| Tx | Il tumore primitivo non può essere definito |
| T0 | Assenza di evidenza del tumore primitivo |
| T1 | Il tumore coinvolge la pleura parietale omolaterale oppure la sola pleura viscerale, con o senza coinvolgimento di pleura viscerale, mediastinica o diaframmatica. |
| T2 | Il tumore coinvolge la pleura omolaterale (viscerale o parietale) con almeno uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento del muscolo diaframma - Invasione del parenchima polmonare |
| T3 | <ul style="list-style-type: none"> - Il tumore coinvolge la pleura omolaterale (viscerale o parietale) con almeno uno dei seguenti: Coinvolgimento della fascia endotoracica - Invasione del grasso mediastinico - Focus solitario di tumore che invade i tessuti molli della parete toracica - Coinvolgimento del pericardio non transmurale |
| T4 | <ul style="list-style-type: none"> - Il tumore coinvolge la pleura omolaterale (viscerale o parietale) con almeno uno dei seguenti: Estensione diffusa o multifocale alla parete toracica con o senza erosione costale associata - Estensione diretta al peritoneo attraverso il diaframma - Estensione alla pleura controlaterale - Estensione diretta del tumore agli organi mediastinici (esofago, trachea, cuore, grandi vasi) - Estensione diretta del tumore alle vertebre, forami intervertebrali, midollo spinale - Estensione del tumore alla superficie interna del pericardio (con o senza versamento pericardico) |
| N | Linfonodi regionali |
| NX | Linfonodi non valutabili |
| N1 | Metastasi ai linfonodi intratoracici omolaterali (bronco-polmonari, ilari, sottocarinali, paratracheali, aorto-polmonari, paraesofagei, peridiaframmatici, del grasso del cuscinetto pericardico, intercostali e mammari interni) |
| N2 | Metastasi ai linfonodi intratoracici controlaterali; metastasi ai linfonodi omolaterali o controlaterali sovraclavari. |
| M | Metastasi a distanza |
| M0 | Assenza di metastasi a distanza |
| M1 | Presenza di metastasi a distanza |

| Stadio | T | N | M |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| IA | T1 | N0 | M0 |
| IB | T2,T3 | N0 | M0 |
| II | T1,T2 | N1 | M0 |
| IIIA | T3 | N1 | M0 |
| IIIB | T1,T2,T3 | N2 | M0 |
| | T4 | Qualsiasi N | M0 |
| IV | Qualsiasi T | Qualsiasi N | M1 |