



PSDTA Carcinoma Uroteliale

Allegato 1 : Fattori di rischio

Anno di pubblicazione 2023

Per la neoplasia alla vescica i principali fattori di rischio sono :

- Fumo di sigaretta: l'incidenza del tumore vescicale è direttamente correlata alla durata e all'intensità dell'esposizione al fumo di sigaretta sia attivo che passivo. I fumatori presentano un RR 3,47 (IC 95% 3,07-3,19).
- Agenti chimici: il rischio di sviluppare un tumore vescicale è aumentato nelle professioni in cui vengono utilizzati coloranti ad eccezione delle tinture per capelli con un RR 13,4 (IC 95% 1,5- 48,2), gomme, tessuti, vernici, pelli e prodotti chimici.
- Fattori ambientale: l'esposizione all'arsenico presente nell'acqua potabile è una causa riconosciuta di tumore alla vescica, così come le amine aromatiche e i pesticidi utilizzati in agricoltura.
- Radioterapia: trattamenti radioterapici a raggi esterni e brachiterapici aumentano il rischio di sviluppare un tumore vescicale quando impiegati nella cura dei tumori ginecologici e del tumore prostatico.
- Fattori dietetici: le evidenze scientifiche in merito ai fattori dietetici restano controverse. L'assunzione di alcol e di un eccesso di carni rosse mostra un lieve aumento del rischio mentre l'assunzione di vitamina D ed un consumo quotidiano di frutta e verdura sembra avere un effetto protettivo.
- Disordini metabolici: valori elevati di pressione arteriosa e di trigliceridi si associano ad un rischio aumentato di tumore vescicale.
- Schistosomiasi
- Genere: gli uomini hanno un rischio maggiore di sviluppare il tumore della vescica.
- Fattori genetici: esistono evidenze scientifiche crescenti riguardo a fattori di suscettibilità genetica e familiarità che condizionano lo sviluppo di neoplasia vescicale.