

Bifosfonati nei pazienti con Mieloma, nell'era post-ONJ: Esperienza di Alessandria

A. Bellora, MT. Corsetti, L. De Paoli, A. Fasciolo,
V. Fusco, S. Gatto, A. Pertino, M. Pini, D. Pietrasanta,
V. Primon, A. Levis, A. Baraldi

Come orientarsi in questo nuovo panorama?

- Bifosfonati utili nella malattia ossea del MM
- Dal 2005 aumento delle segnalazioni di ONJ
- Protocollo di prevenzione
- Linee guida interne per uso dei Bifosfonati



Percorso di prevenzione

- Visita odontoiatrica + Rx Ortopantomografia
- Bonifica dentaria e attesa della guarigione
- Verifica delle protesi
- Igiene orale professionale periodica
- Educazione : all'igiene orale , alla sorveglianza cavo orale, alla segnalazione precoce delle lesioni e sintomi , evitare procedure odonto non conservative.
- Controlli specialistici periodici

COGNOME

NOME

Rev. 18.11.05

SESSO

DATA DI NASCITA

PATOLOGIA

N. MAMMELLA

N. PROSTATA

MIELOMA

ALTRO (.....)

DIFOSFONATO USATO

1).....DAL.....AL.....

TUTTORA IN CORSO

2).....DAL.....AL.....

TUTTORA IN CORSO

ANAMNESI ODONTOIATRICA PRECEDENTE L'USO DI DIFOSFONATI

.....
.....

INFEZIONI RIPETUTE

ESTRAZIONI RIPETUTE

EVENTI TRAUMATICI (.....)

ANAMNESI ODONTOIATRICA DURANTE L'USO DI DIFOSFONATI

.....
.....

INFEZIONI:.....

DOLORE MANDIBOLARE

ESTRAZIONI

DIFFICOLTA' ALLA MASTICAZIONE O DEGLUT

ULCERAZIONI DEL CAVO ORALE

BIOPSIA OSSEA MASCELL / MANDIBOLARE

ALTRI INTERVENTI (.....)

ALTRI FATTORI DI RISCHIO DURANTE L'USO DI DIFOSFONATI

STEROIDI-OCCASIONALE (.....)

TALIDOMIDE

STEROIDI-MASSIVO (.....)

BORTEZOMIB (.....)

RT MANDIBOLA

PROBLEMI CIRCOLATORI PERIFERICI

SINDROMI DA IPERVISCOITA'

COAGULOPATIE (.....)

ANEMIA (.....)

DIABETE

ALCOOL

TABACCO

RX PANORAMICA (ortopantomografia) :

ALTRE INDAGINI (scintigrafia ossea, TAC, RM) :

Linee guida Bifosfonati nei pz con Mieloma multiplo

- Durata della terapia non piu' di 2 anni
- Modificare la schedula ,dopo i due anni in caso di malattia non controllata (Es ogni 3 mesi)
- Tipo di Bifosfonato
- Sospensione del Bifosfonato da 1 a 3 mesi prima di una procedura invasiva e ripresa dopo la guarigione.

Lacy Mayo Clin Proc 2006

Ruggiero ASH 2006

ASCO 2007

Caratteristiche dei nostri pazienti

- Totale 28 pz
- Mieloma multiplo stadio II° e III°
- Sesso : 15 maschi e 13 femmine
- Eta' : m 67 (36-82) anni
- Autotrapianto : 9 pz
- Regime con Thalidomide : 15 pz

Terapie Odontoiatriche

- 5 pz hanno avuto necessita' di eseguire una bonifica dentaria
- 4 pz hanno dovuto eseguire una ribasatura della protesi
- Nessuno ha avuto necessita' di terapie odonto durante i bifosfonati
- Il tempo necessario per l'esecuzione delle procedure richieste prima dell'inizio terapia e' stato di 1,5 mesi (1- 4) mesi

Conclusioni

- Abbiamo esposto il nostro programma di prevenzione
- Raccogliere i dati durante il follow-up per verificarne l'efficacia
- Avviare studi prospettici con schedule differenziate

