



PSDTA Esofago

## **Allegato 7 : Suggerimenti di follow up post trattamento radicale**

**Anno di pubblicazione 2023**

<b>Stadio</b>	<b>Procedura</b>	<b>Periodicità</b>
<b>Ca Esofago Cervicale Trattato con CT/RT esclusiva</b>	Esame clinico	Ogni 3 mesi per 2 anni e poi ogni 6 mesi per 3 anni
	EGDS	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 2 anni, poi annualmente per 3 anni
	TC collo-torace-addome con mdc	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 2 anni, poi annualmente per 3 anni
	PET/TC (in alternativa alla TAC)	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 2 anni, poi annualmente per 3 anni
<b>pTis Resezione endoscopica</b>	Esame clinico	Ogni 3 mesi per 1 anno, poi ogni 6 mesi nel secondo anno, poi annualmente per 3 anni
	EGDS	Ogni 6 mesi per 2 anni, poi annualmente per 3 anni
	TC torace-addome con mdc	Raccomandata in base ad indicazione clinica
<b>pT1 Resezione endoscopica</b>	Esame clinico	Ogni 3 mesi per 1 anno, poi ogni 6 mesi nel secondo anno, poi annualmente
	EGDS	Ogni 3 mesi per 1 anno, poi ogni 6 mesi nel secondo anno, poi annualmente per 3 anni
	TC torace-addome con mdc	Dopo 6 mesi, poi una volta all'anno fino ai 5 anni
<b>pTis, pT1a N0 Esofagectomia +/- CT/RT neoadiuvante</b>	Esame clinico	Ogni 3 mesi per 1 anno, poi ogni 6 mesi nel secondo anno, poi annualmente
	EGDS	A 6 mesi e a 1 anno, poi 1 volta l'anno per altri 4 anni Se residuo esofago di Barrett nel primo anno considerare controllo ogni 3-6 mesi
	TC torace-addome con mdc	Raccomandata in base ad indicazione clinica
<b>pT1b, T2-4, N0-N+ Trattato con CT/RT definitiva</b>	Esame clinico	A 3 mesi, poi ogni 4 mesi fino ai 2 anni, poi ogni 6 mesi per altri 3 anni
	EGDS	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 3 anni, poi una volta l'anno per altri 2 anni
	TC collo-torace-addome con mdc	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 2 anni, poi una volta l'anno per altri 3 anni
<b>pT1b, T2-4, N0-N+ Trattato con esofagectomia +/- CT/RT neoadiuvante</b>	Esame clinico	Dopo 3 mesi, poi ogni 6 mesi fino ai 2 anni, poi una volta l'anno per altri 3 anni
	EGDS	A 1 anno, poi solo in base ad indicazione clinica
	TC torace-addome con mdc	Ogni 6 mesi per i primi 3 anni, poi una volta all'anno per altri 2 anni
	PET/TC	Da eseguire, solo dopo la TC, in casi selezionati