



PSDTA Neoplasie del testicolo

Allegato 2 : Schemi di follow-up personalizzati

**A cura del Gruppo di Studio Urologico
Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta**

Anno di pubblicazione 2022

**Seminoma stadio I basso rischio
in sorveglianza attiva o dopo trattamento adiuvante (chemio o radioterapia)**

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
<i>Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP, LDH esame clinico</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>1 volta</i>	<i>Oncologia</i>
<i>Radiografia del torace</i>	-	-	-	-	-
<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	-	-	-
<i>Ecografia testicolare</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	-

**Seminoma stadio I alto rischio (*)
in sorveglianza attiva o dopo trattamento adiuvante (chemio o radioterapia)**

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
<i>Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP, LDH esame clinico</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>1 volta</i>	<i>Oncologia</i>
<i>Radiografia del torace</i>	-	-	-	-	-
<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	-
<i>Ecografia testicolare</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	-

* Alto rischio: dimensioni del tumore (≥ 4 cm) e/o invasione della rete testis.

Non seminoma stadio I basso rischio (dopo un ciclo di chemioterapia PEB)

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
<i>Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>esame clinico</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>Radiografia del torace</i>	2 volte	1 volta	1 volta	-	-
<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	2 volte	1 volta	-	-	-
<i>Ecografia testicolare</i>	1 volta	1 volta	1 volta	1 volta	-

Non seminoma stadio I rischio intermedio

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
<i>Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>esame clinico</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>Radiografia del torace</i>	2 volte	1 volta	1 volta	-	-
<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	2 volte	2 volte	1 volta	-	-
<i>Ecografia testicolare</i>	1 volta	1 volta	1 volta	1 volta	-

Non seminoma stadio I alto rischio

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
<i>Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>esame clinico</i>	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
<i>Radiografia del torace</i>	3 volte	2 volte	1 volta	-	-
<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	3 volte	2 volte	2 volte	1 volta	-
<i>Ecografia testicolare</i>	1 volta	1 volta	1 volta	1 volta	-

Malattia avanzata basso rischio (^^)

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
esame clinico	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
Radiografia del torace	2 volte	2 volte	1 volta	1 volta	-
Imaging dell'addome (TC o RMN)	2 volte	2 volte	1 volta	1 volta	-
Ecografia testicolare	1 volta	1 volta	1 volta	1 volta	-

^^ Basso rischio: "good-risk" secondo la classificazione IGCCG alla prima linea di trattamento

Malattia avanzata Rischio Intermedio (**)

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
esame clinico	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
Radiografia del torace	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	-
Imaging dell'addome (TC o RMN)	2 volte	2 volte	2 volte	2 volte	-
Ecografia testicolare	1 volta	1 volta	1 volta	1 volta	-

** Rischio intermedio: "intermediate-risk" secondo la classificazione IGCCG alla prima linea di trattamento oppure recidivi/refrattari "very low risk" secondo IPFSG

Malattia avanzata Alto Rischio (*)

Procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° e 5° anno	Dove viene svolta
Esami ematici comprensivi di betaHCG, alfaFP; LDH	4 volte	4 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
esame clinico	4 volte	4 volte	2 volte	2 volte	Oncologia
Radiografia del torace	3 volte	3 volte	2 volte	2 volte	-

<i>Imaging dell'addome (TC o RMN)</i>	<i>3 volte</i>	<i>3 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>2 volte</i>	<i>-</i>
<i>Ecografia testicolare</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>1 volta</i>	<i>-</i>
<i>* Alto rischio: "poor-risk" secondo la classificazione IGCCG alla prima linea di trattamento oppure recidivati/refrattari esclusi "very low risk" secondo IPFSG</i>					