

**Protocollo: CARBOPLATINO (AUC 6) - PACLITAXEL - BEVA**

Descrizione: Burger RA, et al. N Engl J Med, 2011.365:2473-83.

Numero Giorni: 21

**Giorno 1**

Ordine	Infusione	Durata	Farmaco	Dose	Unita	Somm.	Note
1	promemoria			0	ml/Tot	E.V.	Stick urine per proteinuria prima di iniziare la terapia. PAO prima e dopo la terapia.
2	Fisiologica 100 cc	10 m	clorfenamina maleato	10	mg/Tot	E.V.	
3	bolo	1 m	palonosetron cloridrato	0,25	mg/Tot	E.V.	30 minuti prima del Taxolo.
4	Fisiologica 100cc	10 m	desametasone sodio fosfato	20	mg/Tot	E.V.	programmare terapia per emesi moderata.
5	Fisiologica 100 cc	15 m	ranitidina cloridrato	100	mg/Tot	E.V.	
6	Fisiologica 500cc	3 h	paclitaxel	175	mg/m <sup>2</sup>	E.V.	175 mg/m <sup>2</sup>
7	-	10 m	SODIO CLORURO 0,9%	100	ml/Tot	E.V.	
8	Fisiologica 500 cc	60 m	carboplatino	6	AUC	E.V.	AUC 6
9	-	10 m	SODIO CLORURO 0,9%	100	ml/Tot	E.V.	
10	promemoria			0	ml/Tot	E.V.	Prima dose di Bevacizumab in 90 m'. Se ben tollerata la seconda in 60 m' e le successive in 30 m'.
11	Fisiologica 100 cc	30 m	bevacizumab	15	mg/kg	E.V.	AVASTIN 15 mg/kg. Dal ciclo n° 2. (confezione da 100 mg). Scheda AIFA.
12	-	10 m	SODIO CLORURO 0,9%	100	ml/Tot	E.V.	
<b>Totale Durata 336 m</b>							