ABIRATERONE (ZYTIGA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento del tumore della prostata. Ciascuna capsula di Zytiga contiene 250 mg di principio attivo (abiraterone).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il trattamento con abiraterone prevede l'assunzione giornaliera di **4 compresse insieme** in associazione ad una dose raccomandata di 10 mg di prednisone.

COME SI PRENDE?

Le compresse di Abiraterone devono essere assunte a digiuno, e non può essere consumato cibo per almeno un'ora dopo aver assunto le compresse.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di abiraterone continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Iperico (erba di San Giovanni), pompelmo, lime, arancia amara, sotto forma di frutti, succhi o prodotti erboristici/integratori, echinacea, aglio, acido alfa-lipoico, ginkgo, pepe nero e bianco, liquirizia, menta, quercetina, riso rosso fermentato, melograno, carbone attivato, semi di lino, crusca, resveratrolo, valeriana, vitamina C, vitamina E, aloe vera, cascara (non per impiego occasionale ad uso alimentare). Eviti l'assunzione di qualsiasi lassativo, anche naturale, in concomitanza con il farmaco in quanto potrebbe ridurne l'assorbimento.

rete oncologica

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono aumento di liquidi agli arti inferiori, innalzamento della pressione sanguigna, infezioni delle vie urinarie.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona perciò si ricordi di descrivere sempre con cura come si sente al suo medico di riferimento.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se ha debolezza muscolare, spasmi muscolari o sensazione di battito del cuore accelerato (palpitazioni), febbre persistente > 38°c, svenimenti, perdita di peso contatti il suo medico di riferimento.

Durante il trattamento con abiraterone si ricordi di controllare spesso i valori della pressione sanguigna.

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Possono essere necessarie sospensioni nell'assunzione di alcune dosi in base alla sicurezza e tollerabilità*
- *La co-somministrazione con induttori/inibitori potenti del CYP3A4 deve essere evitata.*
- *I pazienti devono essere sottoposti a screening per l'ipertensione e controllati in modo appropriato.*

Si raccomanda la sospensione temporanea del trattamento in pazienti con grave ipertensione non controllata con trattamento farmacologico.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: _____

Farmacia: _____

MMG: _____

rete oncologica