# AFATINIB (GIOTRIF®)

Il farmaco che sta assumendo è utilizzato per trattare i pazienti adulti con tumore polmonare

.Ciascuna compressa rivestita può contenere 20 mg, 30 mg, 40 mg o 50 mg di principio attivo.

### **COME LO CONSERVO?**

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

La dose raccomandata è di 40 mg una volta al giorno. La dose potrebbe essere modificata in funzione della tollerabilità a questo medicinale.

Il trattamento deve essere continuato secondo indicazione del medico.

oncologica

## **COME SI PRENDE?**

Afatinib deve essere assunto a digiuno. Prenda questo medicinale almeno 1 ora prima del pasto, o se ha già mangiato, attenda almeno 3 ore prima di assumerlo. Non rompa, mastichi o schiacci la compressa. Assuma la compressa intera o, se non è possibile, la disperda in un bicchiere di acqua non gassata.

#### E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

### E SE NE DIMENTICO UNA?

Se la dose successiva è prevista dopo più di 8 ore, prenda la dose dimenticata non appena possibile. Se la dose successiva è prevista entro 8 ore, salti la dose dimenticata e prenda quella successiva al solito orario. Quindi prosegua ad assumere le compresse agli orari regolari come al solito.

#### **MA ATTENZIONE!!!**

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO!

# POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Afatinib può dare luogo ad interazioni con: ritonavir, ketoconazolo itraconazolo, eritromicina, nelfinavir, saquinavir verapamil, chinidina, amiodarone, ciclosporina A, tacrolimus, carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, rifampicina.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

## SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:



Coenzima Q10, iperico, vitamina C, vitamina E, acido alfa-lipoico, agar e alginati, carbone attivo, arancio dolce, sostanze ad azione lassativa (es. aloe) e ricche di fibre (crusca di riso).

Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE pompelmi, lime e arance amare (frutto o succo), mele cotogne, bevande alcoliche e caffè, cibi piccanti, molto grassi e fermentanti (es fagioli).





## EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono diarrea, nausea, vomito, eruzioni cutanee, malattia polmonare interstiziale (infiammazione dei polmoni), infiammazione o irritazione oculare, infiammazione della bocca, rossore e screpolatura mani/piedi, infezione ungueale.

#### **ALCUNI CONSIGLI?**

#### ARROSSAMENTI E SCREPOLATURE **MANI/PIEDI**

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
- Utilizzi prodotti solari schermanti.
- Idrati sempre le parti con una crema apposita almeno due volte al dì.
- Eviti di indossare scarpe strette.

#### INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

- Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco.
- Faccia degli sciacqui con acqua e bicarbonato tre volte al dì.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO. DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se nota effetti, quali: comparsa di eruzioni cutenee (screpolature o vesciche), improvviso peggioramento del respiro anche con tosse o febbre, sanguinamento

dal naso o dalle gengive, improvvisa inflammazione oculare, comparsa di bolle o ulcere sulla mucosa della bocca, comparsa di sangue nell'urina o nelle feci, comparsa al palmo delle mani o

dei piedi di un formicolio o bruciore o gonfiore/vescicole, contatti subito il suo medico.

# CONTATTI UTILI: Equipe medico-infermieristica: Farmacia: MMG: \_\_\_\_\_

## **MEMORANDUM** PER GLI OPERATORI **SANITARI**

- È importante assumere questo medicinale a digiuno.
- Deve essere effettuata una valutazione di tutti i pazienti con insorgenza acuta e/o peggioramento inspiegato di sintomi polmonari per escludere la malattia polmonare interstiziale (ILD).
- Si raccomanda un più stretto monitoraggio dei pazienti di sesso femminile, con peso corporeo ridotto o con compromissione renale di base.
- In caso di rash cutaneo/acne un intervento precoce (es:con emollienti, antibiotici) può facilitare la continuità del trattamento con Afatinib.
- Se è necessario assumere inibitori della P-gp, questi devono essere somministrati ricorrendo ad una somministrazione sfalsata.
- Afatinib contiene lattosio.
- I pazienti in cura con Afatinib possono manifestare alterazioni della vista e della capacità di concentrarsi causando difficoltà nella guida di veicoli e uso di macchinari.





oncologica