CERITINIB (ZYKADIA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il tumore polmonare.
Ciascuna compressa rivestita di ceritinib contiene 150 mg di principio attivo.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata è di 450 mg (pari a 3 capsule) da assumere per bocca una volta al giorno.

rete oncologica
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Le capsule di ceritinib devono essere assunte una volta giorno, alla stessa ora, ogni giorno, con del cibo (es. spuntino o pasto completo).
Le capsule devono essere deglutite intere con acqua: non masticarle e non schiacciarle

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se la dose successiva è tra 12 o più ore, prenda le capsule dimenticate non appena se ne ricorda. Prenda le capsule successive alla solita ora.
Se la dose successiva è tra meno di 12 ore, salti le capsule dimenticate.
Prenda le capsule successive alla solita ora.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Informi il medico se sta assumendo warfarin, antibiotici (claritromicina, eritromicina, rifampicina), antifungini (itraconazolo, ketoconazolo, posaconazolo, voriconazolo), antivirali (ritonavir, saquinavir), antinfiammatori (naprossene, piroxicam, diclofenac, celecoxib), desametasone, simvastatina, atorvastatina, aloperidolo, carbamazepina, midazolam, cisapride.
È possibile che medicinali senza prescrizione medica come vitamine o integratori a base di erbe possano interagire con ceritinib.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Pompelmo e succo di pompelmo, iperico (erba di San Giovanni), birra, vino, acido alfa-lipoico, arancio amaro, cassia, coenzima Q10, glucosamina, glutammina, centella asiatica, celidonia, tè verde, N-acetilglucosamina, noni (gelso indiano), lievito di riso rosso, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ramno, mela cotogna, pera cotogna, acido tannico, carbone attivo, agar, frangula, algina, aloe, castagna americana ed europea, orzo, zucca butternut, carragenina (carraghenina), cascara sagrada, carbone di caffè, mandragora, glucomannano, lichene islandico, gomma sterculia, marshmallow, efedra, quillaia (legno di Panama), ratania, rabarbaro, crusca, olmo rosso, gomma adragante

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono diarrea, nausea, vomito, stanchezza, dolore addominale, diminuzione dell'appetito, diminuzione di peso, stipsi ed eruzione cutanea.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se nota effetti quali:
stanchezza, prurito, ingiallimento della pelle o degli occhi, diminuzione dell'appetito, dolore addominale, urine scure o marroni, sanguinamento o formazione di lividi, insorgenza o peggioramento di tosse con o senza muco, febbre, dolore o fastidio al petto, difficoltà di respirazione o mancanza di respiro,
cambiamenti nel battito cardiaco (veloce o lento), svenimento, capogiri, colorazione blu delle labbra, gonfiore agli arti inferiori o della pelle, sete eccessiva o aumento della frequenza della minzione, contatti subito il suo medico curante.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Evitare l'uso concomitante di potenti inibitori del CYP3A durante il trattamento con ceritinib- Evitare la co-somministrazione di ceritinib con substrati principalmente metabolizzati da CYP3A o substrati del CYP3A con ristretto indice terapeutico; se possibile, utilizzare medicinali alternativi meno sensibili all'inibizione del CYP3A4. Se inevitabile, deve essere presa in considerazione una riduzione della dose per i medicinali co-somministrati che sono substrati del CYP3A con indici terapeutici ristretti.*
- *Utilizzare cautela in caso di uso concomitante con inibitori della P-gp: la concentrazione di ceritinib potrebbe aumentare.*
- *Utilizzare cautela in caso di uso concomitante di induttori di P-gp.*
- *Ceritinib può causare un prolungamente di QTc- Prestare cautela in caso di uso concomitante di inibitori della pompa protonica.*
- *Evitare la co-somministrazione con substrati metabolizzati da CYP2C9 o substrati del CYP2C9 con ristretto indice terapeutico.*
- *Utilizzare cautela in caso di uso concomitante di substrati del BCRP e di substrati del P-gp.*
- *Ceritinib può causare affaticamento o disturbi della visione.*
- *Ceritinib può causare iperglicemia: effettuare il monitoraggio della glicemia a digiuno prima dell'inizio del trattamento con ceritinib e periodicamente*

rete oncologica