CRIZOTINIB (XALCORI®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il tumore del polmone.
Ciascuna capsula di Xalcori può contenere 250 mg, oppure 200 mg di principio attivo (crizotinib).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. Generalmente la dose raccomandata è di una capsula da 250 mg due volte al giorno (per un totale di 500 mg al dì), ma in base alla tollerabilità la dose può essere ridotta.

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Le capsule di Xalcori devono essere deglutite intere, senza scioglierle o aprirle, con acqua, all'incirca alla stessa ora (mattina e sera), con o senza cibo indifferentemente.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una dose questa deve essere assunta appena possibile ma se mancano meno di 6 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata!
Eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Se è in terapia con antibiotici appartenenti alla classe dei macrolidi (es. claritromicina), antifungini (es. ketoconazolo) e farmaci per il trattamento dell'HIV gli effetti collaterali di Xalcori potrebbero esser accentuati.
Se prende Xalcori mentre è in trattamento con contraccettivi orali, questi potrebbero risultare inefficaci. Si consiglia pertanto un metodo contraccettivo alternativo.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI PRODOTTI A BASE DI:

Pompelmo / succo di pompelmo, Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum), prodotti contenenti, efedra/efedrina, DHEA, echinacea, eucalipto, aglio, gingko, resveratrolo.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, perché variano da individuo ad individuo.
I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono: disturbi visivi, nausea e/o vomito, dolori addominali con diarrea e/o stipsi, gonfiore di mani e piedi, stanchezza, diminuzione dell'appetito, capogiri, ipersensibilità al freddo e sensibilità alterata al gusto.

ALCUNI CONSIGLI?

- ✓ Eviti di indossare scarpe strette e guanti di gomma
- ✓ Eviti cibi acidi, piccanti, molto grassi e fermentanti (es. fagioli), alcol e tabacco

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA ED ERUZIONI CUTANEE faccia riferimento al libretto generale.

Se nota effetti quali febbre, difficoltà a respirare associata a tosse, sensazione di svenimento e testa vuota, formazione di lividi sulla pelle, sanguinamento dal naso o dalle gengive, comparsa di urine scure contatti subito il suo medico curante.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: _____

Farmacia: _____

MMG: _____

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Per tutti i pazienti è raccomandato un attento monitoraggio.*
- *La terapia con Xalcori è controindicata nei pazienti con compromissione epatica severa.*
- *Occorre esercitare la debita cautela nel somministrare Xalcori insieme a farmaci interagenti con il CYP3A4 (fenitoina, carbamazepina, rifampicina, agenti bradicardizzanti.)*
- *E' stato osservato un prolungamento dell'intervallo QT con Xalcori. In caso di co-somministrazione con farmaci noti per prolungare l'intervallo QT è richiesto un attento monitoraggio.*
- *Xalcori può indurre bradicardia.*
- *I pazienti in cura con Xalcori devono essere informati che questo farmaco può inflenzare in modo lieve o moderato la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.*

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te