DASATINIB (SPRYCEL®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per la Leucemia Mieloide Cronica (LMC) e la Leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva (LLA Ph').

Il farmaco è disponibile in compresse rivestite nei dosaggi da 50, 80,100 e 140mg.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata inizialmente per la LMC è 100 mg di dasatinib 1 volta al giorno; per la LLA è 140 mg 1 volta giorno. Le dosi successive verrano prescritte dal suo medico sulla base della efficacia e della tolleranza al farmaco.

COME SI PRENDE?

Le capsule di Dasatinib devono essere ingerite intere.
I pazienti non devono frantumare né sciogliere le capsule. Il Dasatinib può essere assunto con o senza cibo.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Dasatinib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Dasatinib può potenziare l'effetto anticoagulante degli agenti con proprietà anticoagulante.
E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Bevande alcoliche, pompelmo, iperico, echinacea, carbone attivo, arancio amaro, boldo, cassia, uncaria, artiglio del diavolo, eucalipto, berberina, partenio, aglio, ginko biloba, thè verde, succo di pompelmo,arancia rossa, erba di san giovanni e succo di carambola vanno evitate.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono diarrea, cefalea, rash cutanei, dolore muscoloscheletrico, nausea, affaticamento muscolare, mialgia, vomito.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se nota effetti quali:

infezione delle prime vie respiratorie e difficoltà respiratorie, depressione, insonnia, forte dolore allo stomaco e alla schiena, febbre, debolezza, capogiri, affaticamento, sanguinamento, comparsa di lividi, vampate, arrossamento, rossore del volto, difficoltà nel parlare o nel muoversi, sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe o delle braccia, estremità degli arti fredde, contatti subito il suo medico curante.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

L'associazione di potenti inibitori del CYP2C8 devono essere evitati o usati con cautela.
Dasatinib è un potente induttore enzimatico e aumenta la sintesi di molti enzimi e trasportatori.
Sono attese interazioni con alcuni medicinali che sono eliminati attraverso metabolizzazione o con trasporto attivo: analgesici, antibiotici, antineoplastici, anticoagulanti , antiepilettici , antipsicotici, betabloccanti, calcioantagonisti, glicosidi cardiaci, corticosteroidi, antivirali HIV, ipnotici, statine metabolizzate dal CYP3A4 , farmaci tiroidei.
Valutare attentamente l'uso concomitante di Dasatinib con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT, con antiaritmici di classe IA o di classe III, metadone, antipsicotici etc.