ENCORAFENIB (BRAFTOVI)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico e in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata inizialmente per il melanoma è 450 mg una volta al giorno; per il carcinoma del colon retto è 300 mg una volta al giorno.
Il medicinale è in commercio nel dosaggio da 50 e 75 mg.

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Le capsule di Braftovi devono essere ingerite intere.
I pazienti non devono frantumare né sciogliere le capsule.
Il Braftovi può essere assunto con o senza cibo.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Encorafenib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici, interferiscano con l'azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Bevande alcoliche, pompelmo, iperico, mela, carbone attivo, arancio amaro, boldo, cassia, uncaria, artiglio del diavolo, echinacea, eucalipto, berberina, partenio, aglio, ginko biloba, thè verde, liquirizia, lime, quercetina, trifoglio rosso, riso rosso fermentato, resveratrolo, curcuma, valeriana, vitamina A, Vitamina E , glucomannano, aloe.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono stanchezza, nausea, diarrea, vomito, distacco retinico, dolore addominale, artralgia, aumento della CPK ematica e mialgia.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se nota effetti quali: difficoltà respiratoria, forte dolore allo stomaco , febbre, marcata debolezza, capogiri, affaticamento, sanguinamento, comparsa di lividi, vampate, arrossamento, rossore del volto, difficoltà nel parlare o nel muoversi, sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe o delle braccia, estremità degli arti fredde contatti subito il suo medico curante.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Prima di iniziare il trattamento con Braftovi si deve valutare il profilo cardiovascolare del paziente. Si raccomanda di valutare un elettrocardiogramma (ECG) prima di iniziare il trattamento un mese dopo l'inizio e poi a intervalli di circa 3 mesi o più frequentemente come clinicamente indicato, durante il trattamento.*
- *Si deve considerare la riduzione/aggiustamento della dose in terapia concomitante con forti inibitori del CYP3A4 come posaconazolo ritonavir, itraconazolo, claritromicina e succo di pompelmo.*
- *Per i pazienti con compromissione renale lieve o moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose.*
- *Reazioni avverse come disturbi della vista, capogiri, sonnolenza e stanchezza sono state associate all'assunzione del farmaco, pertanto si deve raccomandare cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari.*

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te