ENZALUTAMIDE (XTANDI®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato il trattamento del cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione.
Ciascuna capsula molle contiene 40 mg di enzalutamide.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Non assuma capsule che perdono liquido, sono danneggiate o mostrano segni di manomissione

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Generalmente, la dose raccomandata è 160 mg di enzalutamide (4 capsule da 40 mg) in singola dose orale giornaliera.
Nel caso in cui si verifichi la comparsa di tossicità o di reazioni avverse, il medico potrebbe decidere di variare la posologia, se giustificato.
Non sospenda questo medicinale se non su richiesta del medico.

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Le capsule molli di enzalutamide devono essere deglutite intere con acqua, con o senza cibo

E POI...

Non rompa, né apra o mastichi la capsula, per evitare un'esposizione involontaria al contenuto!

E SE NE DIMENTICO UNA?

- Se dimentica di prendere enzalutamide all'ora consueta, assuma la sua dose abituale non appena se ne ricorda
- Se dimentica di prendere enzalutamide per l'intera giornata, assuma la sua dose abituale il giorno seguente
- Se dimentica di prendere enzalutamide per più di un giorno, contatti il medico

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Enzalutamide dà luogo a interazioni con numerosi medicinali molto comuni ad esempio antibiotici, farmaci per abbassare il colesterolo, per trattare le malattie cardiache, per l'ipertensione, per la tiroide.
Alcuni farmaci usati per l'asma o malattie respiratorie, per la cura di alcuni disturbi psichiatrici, per la terapia del dolore possono aumentare il rischio di convulsoni.

ASSOLUTAMENTE VIETATI

Enzalutamide dà luogo a interazioni con numerosi medicinali molto comuni ad esempio antibiotici, farmaci per abbassare il colesterolo, per trattare le malattie cardiache, per l'ipertensione, per la tiroide.
Alcuni farmaci usati per l'asma o malattie respiratorie, per la cura di alcuni disturbi psichiatrici, per la terapia del dolore possono aumentare il rischio di convulsoni.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono cefalea, vampate di calore, stanchezza, ipertensione, disturbi cognitivi, ginecomastia, pelle secca, prurito.

AVVERTENZE SPECIALI E CONSIGLI UTILI

- Tra le condizioni che possono esporre a un aumentato rischio di convulsioni vi sono:
- se ha avuto precedenti episodi convulsivi o gravi lesioni alla testa
- se ha avuto alcuni tipi di ictus
- se ha avuto un tumore cerebrale
- se assume grandi quantità di alcool
- se assume un medicinale che può causare convulsioni

Enzalutamide può avere effetto sulla fertilità maschile
Se ha rapporti sessuali con una donna che potrebbe iniziare una gravidanza (o in stato di gravidanza), utilizzi il profilattico e un altro metodo contraccettivo durante il trattamento e nei tre mesi successivi all'interruzione del trattamento.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

- Se ha un episodio convulsivo, interrompa il trattamento e si rivolga al medico al più presto
- Se ha mal di testa in peggioramento, confusione, problemi alla vista, contatti il medico appena possibile

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: _____

Farmacia: _____

MMG: _____

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *I potenti inibitori del CYP2C8 devono essere evitati o usati con cautela.*
- *Xtandi è un potente induttore enzimatico (CYP3A, il CYP2B6, il CYP2C9, il CYP2C19, Pgp e UGTs) e aumenta la sintesi di molti enzimi e trasportatori.*
- *Sono attese interazioni con alcuni medicinali che sono eliminati attraverso metabolizzazione o con trasporto attivo: analgesici, antibiotici, antineoplastici, anticoagulanti , antiepilettici , antipsicotici, betabloccanti, aalcioantagonisti, glicosidi cardiaci, corticosteroidi, antivirali HIV, ipnotici, statine metabolizzate dal CYP3A4 , farmaci tiroidei.*
- *Valutare attentamente l'uso concomitante di Xtandi con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT, con antiaritmici di classe IA o di classe III, metadone, antipsicotici etc.*
- *Enzalutamide può alterare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari essendo stati riferiti episodi psichiatrici e neurologici incluse convulsioni.*

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te