

ERLOTINIB (TARCEVA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento del tumore polmonare e del tumore al pancreas. Ciascuna compressa rivestita di Tarceva può contenere 100 mg oppure 150 mg di principio attivo (erlotinib).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

- Pazienti con tumore polmonare:
1 compressa da 150 mg una volta al giorno.
- Pazienti con tumore pancreatico:
1 compressa da 100 mg una volta al



E' possibile che nel corso del trattamento il suo medico decida di ridurre la dose del farmaco.

COME SI PRENDE?

Le compresse di Erlotinib devono essere assunte a stomaco vuoto, almeno un'ora prima o due ore dopo aver assunto del cibo, sempre alla stessa ora.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Erlotinib continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

**NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO !**

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque
altro medicinale, chiedi sempre
consiglio al Suo medico.**

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI
LIMITARE L'USO DI:**



Pompelmo sotto forma di frutti, succhi o prodotti erboristici/integratori, prodotti come acido alfa-lipoico, olio di semi di lino, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, aloe vera, cascara, carbone attivo, glucomannano, glucosammina, glutammina e crusca di riso (non per impiego occasionale ad uso alimentare).

Si consiglia di evitare l'uso di prodotti a base di Iperico (Erba di San Giovanni) e il fumo di sigaretta perché potrebbero ridurre l'efficacia del farmaco.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto **POTREBBE** provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono ritardati.

Durante l'utilizzo di Erlotinib potrebbero verificarsi casi di eruzione cutanea che potrebbero peggiorare nelle aree esposte al sole.

ALCUNI CONSIGLI?

ARROSSAMENTI E SCREPOLATURE MANI/PIEDI

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
- Utilizzi prodotti solari schermanti.
- Idrati sempre le parti con una crema apposita almeno due volte al dì.
- Eviti di indossare scarpe strette.

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

- Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco.
- Faccia degli sciacqui con acqua e bicarbonato tre volte al dì.

**In caso di comparsa di
NAUSEA e/o VOMITO,
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale
su "la terapia onco-ematologica orale".**

L'USO DI FARMACI PROTETTORI DELLO STOMACO (es. omeprazolo) DOVREBBERO ESSERE EVITATI

in quanto possono ridurre l'effetto
terapeutico di Erlotinib.

Se si considera necessario l'utilizzo di antiacidi (es. maalox®, citrosodina®) questi devono essere assunti almeno 4 ore prima o 2 ore dopo la somministrazione di erlotinib.

Se si prende in considerazione l'impiego della ranitidina, somministrare i due farmaci in modo sfalsato: erlotinib deve essere assunto almeno 2 ore prima o 10 ore dopo la somministrazione di ranitidina.

Nel caso di comparsa di diarrea severa associata a nausea e/o vomito, difficoltà a respirare con tosse e febbre persistente ($> 38^{\circ}\text{C}$) o in caso di dolore all'occhio con peggioramento della vista interrompa l'uso di erlotinib e contatti al più presto il suo medico di riferimento.



MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Possono essere necessarie sospensioni nell'assunzione di alcune dosi in base alla sicurezza e tollerabilità.*
- *La co-somministrazione con induttori/inibitori potenti del CYP1A1, CYP3A4 e CYP2C8 deve essere evitata.*
- *In pazienti con alterazioni epatiche o in trattamento con farmaci epatotossici si raccomanda un esame periodico della funzionalità epatica.*

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

