EVEROLIMUS (AFINITOR®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato, tumori neuroendocrini di origine pancreatica, gastrointestinale o polmonare, carcinoma renale.
Il farmaco è disponibile nei dosaggi di 2,5, 5 e 10 mg.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei .
La dose iniziale per un'adulto è 10 mg una volta al giorno.
Sono previste variazioni di dosaggio .

COME SI PRENDE?

Le compresse di everolimus devono essere ingerite intere, con o senza cibo sempre alla stessa ora.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di everolimus prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Everolimus ha proprietà immunosoppressive e può predisporre i pazienti ad infezioni batteriche, micotiche, virali o da protozoi, comprese infezioni con patogeni opportunistici.
E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Pompelmo, iperico, mela cotogna, , acido tannico, carbone attivo, arancio amaro, aglio, frangula, sambuco, crespino, pepe nero, artiglio del diavolo, lime, quercetina, trifoglio rosso, resveratrolo, valeriana, Vitamina E , glucomannano.

rete oncologica

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto potrebbe provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono capogiri, stomatiti, mal di testa, infezioni del tratto urinario, variazioni importanti di peso, febbre, tosse, respirazione difficile o dolorosa, sibili, dolore al petto durante la respirazione, flatulenza frequente, stipsi, pressione alta.

Se nota effetti quali:

diarrea, febbre, rash cutaneo, ipertensione, nausea, cefalea, affaticamento, anoressia, vomito, disgeusia, stomatite, diminuzione del peso, dolore, aumento dell'alanina aminotransferasi e aumento dell'aspartato aminotransferasi contatti subito il suo medico curante.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

Il trattamento con everolimus può causare aumento della glicemia, dei valori di trigliceridi e colesterolo.

I pazienti che assumono Afinitor in concomitanza di ACE-inibitori (ad esempio ramipril) possono presentare un aumento del rischio di angioedema.

Sono stati osservati in pazienti trattati con Afinitor casi di insufficienza renale (compresa insufficienza renale acuta).