FLUDARABINA (FLUDARA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di un particolare tipo di leucemia.
Ciascuna compressa di Fludara contiene 10 mg di principio attivo.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il trattamento prevede l'assunzione di Fludara per 5 giorni consecutivi ogni 28 giorni. Il numero di compresse da assumere varia da individuo a individuo, sarà il medico ad indicarle il numero di compresse da assumere.

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Le compresse possono essere assunte a stomaco pieno o vuoto e vanno deglutite intere con acqua, senza masticarle.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di fludara si rivolga il prima possibile al medico.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Durante e dopo il trattamento con Fludara, eviti di sottoporsi a vaccinazioni.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

ASSOLUTAMENTE VIETATI

Prodotti a base di Coenzima Q10, iperico, vitamina C, vitamina E, acido alfa-lipoico, , glucosamina, glutamina,carbone attivo, lassativi naturali (es.aloe, rabarbaro, cascara..), cibi e prodotti erboristici ricchi di mucillagini o di fibre.

Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE pompelmi, lime e arance (frutto o succo), bevande alcoliche e caffè, bevande troppo calde o fredde, cibi piccanti, molto grassi e fermentanti (es fagioli).

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo: temporanea riduzione della produzione di cellule ematiche con possibili: anemia, spossatezza, facile insorgenza di infezioni, febbre, lividi, emorragie; dolori articolari, brividi, innalzamento dei livelli di acido urico, fosfato, calcio e potassio, nausea, vomito, diarrea, tosse, debolezza, eruzione cutanea, cistite, ulcere alla bocca, alterazione del gusto, reazioni allergiche

AVVERTENZE SPECIALI E CONSIGLI UTILI

- Se è una donna o un uomo in età fertile, deve adottare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento e per almeno 6 mesi dopo il trattamento
- E' sconsigliata l'esposizione diretta al sole, si consiglia l'impiego di creme solari ad alta protezione
- Fludara può causare innalzamento degli acidi urici e insufficienza renale,tali effetti sono reversibili; può giovare bere molti liquidi
- La terapia può causare un'eruzione cutanea, simile all'acne, che può dare prurito. Sono consigliati saponi neutri e creme idratanti
- Si lavi i denti con cautela

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Se nota effetti, quali:

- difficoltà a respirare, ha la tosse o sente dolore al petto con o senza febbre;
- lividi insoliti o un sanguinamento più forte del solito dopo una ferita o se le sembra di sviluppare più infezioni;
- dolore al fianco oppure nota la presenza di sangue nell'urina o produce una minore quantità di urina

contatti subito il suo medico curante

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: _____

Farmacia: _____

MMG: _____

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

La somministrazione di Fludara può essere associata a leucoencefalopatia (LE), leucoencefalopatia tossica acuta (ATL), o a sindrome leucoencefalopatica posteriore reversibile (RPLS).

Queste possono verificarsi alla dose raccomandata

① *quando Fludara viene somministrato in seguito, o in associazione, a medicinali noti per essere correlati con LE, ATL, RPLS*

② *quando Fludara è somministrato in pazienti con altri fattori di rischio come irradiazione cranica o totale, trapianto di cellule ematopoietiche, malattia del trapianto contro l'ospite, danno renale o encefalopatia epatica.*

A dosi superiori

- *Si raccomandano controlli periodici del quadro ematologico per identificare l'insorgenza di anemia, neutropenia e trombocitopenia.*
- *L'incidenza di nausea/vomito è più elevata con l'impiego della formulazione orale che con quella endovenosa.*
- *E' di estrema importanza l'escrezione renale per l'eliminazione del prodotto.*
- *Fludara può ridurre la capacità di guidare veicoli ed usare macchinari..*

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te