

GEFITINIB (IRESSA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico. Ciascuna capsula di Iressa contiene 250 mg di gefitinib.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Un ciclo completo di trattamento con Iressa prevede l'assunzione di 1 compressa da 250 mg una volta al giorno con o senza cibo intorno alla stessa ora del giorno.



COME SI PRENDE?

Iressa dev'essere deglutita con un po' di acqua o, se non è possibile può essere sciolta in acqua (in nessun altro liquido) attendendo fino a completo scioglimento e bevuta subito

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di iressa continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

**NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO**

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque
altro medicinale, chiedi sempre
consiglio al Suo medico.**

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco nell'organismo.

**ASSOLUTAMENTE
VIETATI**



- ☞ Prodotti a base di iperico (erba di san Giovanni),
- ☞ Pompelmo, lime, arancia amara, sotto forma di frutti, succhi o prodotti erboristici /integratori.

Eviti l'assunzione di qualsiasi lassativo, anche naturale, preso in concomitanza con il farmaco in quanto potrebbe ridurne l'assorbimento.

Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE prodotti contenenti principi attivi in forma concentrata (non per impiego occasionale ad uso alimentare) come: echinacea, aglio, acido alfa-lipoico, acido tannico, berberina, ginkgo, pepe nero e bianco, liquirizia, menta, quercetina, riso rosso fermentato, melograno, carbone attivato, semi di lino, crusca, resveratrolo, valeriana, vitamina C, vitamina E, aloe vera, cascara, mela cotogna.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Come tutti i medicinali IRESSA può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona perciò si ricordi di descrivere sempre con cura come si sente al suo oncologo e/o al MMG.

Durante l'utilizzo di Iressa alcuni dei seguenti effetti potrebbero risultare più frequenti: diarrea, vomito, nausea, reazioni cutanee come rash acneiforme, talvolta con prurito e pelle secca e/o screpolata, perdita di appetito, debolezza, bocca secca, arrossata o dolorante.

**In caso di comparsa di
NAUSEA e/o ALTERAZIONE DEL
SENSO DEL GUSTO, DIARREA E
CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale.**



Se ha febbre persistente
> 38°C, svenimenti,
perdita di peso, interrompa
l'uso di iressa
e contatti il suo medico.

Durante il trattamento con iressa, si ricordi di controllare spesso i valori della pressione sanguigna.



MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Possono essere necessarie sospensioni nell'assunzione di alcune dosi in base alla sicurezza e tollerabilità.*
- *La co-somministrazione con induttori/inibitori potenti del CYP3A4 deve essere evitata.*
- *I pazienti devono essere sottoposti a screening per l'ipertensione e controllati in modo appropriato. Si raccomanda la sospensione temporanea del trattamento in pazienti con grave ipertensione non controllata con trattamento farmacologico.*
- *Si consiglia di monitorare il possibile aumento dell'enzima epatico alanina aminotransferasi.*

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

