

# IDELALISIB (ZYDELIG®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per la leucemia linfatica cronica (CLL) e per il linfoma follicolare (FL).

Ciascuna compressa rivestita di Idelalisib può contenere 100 mg o 150 mg di principio attivo.

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata inizialmente è 150 mg di Idelalisib due volte al giorno. E' possibile che venga decisa una riduzione di dose a 100 mg due volte al giorno.



## COME SI PRENDE?

Le compresse di Idelalisib devono essere ingerite intere.

**I pazienti non devono masticare né frantumare le compresse. Zydelig può essere assunto con o senza cibo.**

**E POI...**

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

## E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Idelalisib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio

**MA ATTENZIONE!!!**

**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.**

L'uso di Zydelig con farmaci sedativi come il Midazolam può aumentarne il loro effetto sedativo.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Iperico, echinacea, lievito di riso rosso, riso rosso fermentato, cannabis, pompelmo, sambuco, berberina, girardina silvestre, arancio amaro, pepe nero, coenzima Q10, artiglio del diavolo, ergot, eucalipto, crespino, tetradio, aglio, camomilla, ginkgo biloba, glucosammina, gugal, liquirizia, lime, menta piperita, quercetina, resveratrolo, valeriana, vitamina C, vitamina E, melograno, ginseng, mela cotogna, carbone attivo, agar, aloe, orzo, zucca, ratania, rabarbaro, crusca di riso

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto **POTREBBE** provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono infezione delle vie respiratorie superiori, diarrea, colite, eruzione cutanea, febbre.

Se nota effetti quali:

infezione polmonare, forte dolore addominale, diarrea, colite, febbre, debolezza, affaticamento, eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie, dolore delle gambe o delle braccia, contatti subito il suo medico curante.



## CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

**In caso di comparsa di  
NAUSEA e/o VOMITO,  
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI  
faccia riferimento al libretto generale  
su “la terapia onco-ematologica orale”.**

# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Per gestire le tossicità ematologiche e non ematologiche, devono essere considerate modifiche della dose o interruzioni del trattamento*
- *Deve essere evitato, l'uso concomitante di Zydelig substrati CYP3A come alfuzosina, amiodarone, cisapride, pimozide, chinidina, ergotamina, quetiapina, lovastatina, simvastatina, sildenafil, midazolam, triazolam, salmeterolo, tolvaptan, ivabradina, ranolazina, nifedipina, tamsulosina...*
- *E' controindicato il trattamento con induttori del CYP3A4 (carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina e erba di San Giovanni) durante la terapia con Idelalisib*
- *In caso di utilizzo concomitante con agenti anticoagulanti come il warfarin si raccomanda il monitoraggio del INR; anche dopo la sospensione del trattamento con Zydelig*
- *Se Idelalisib viene somministrato con farmaci analgesici (ad es. fentanil, metadone, buprenorfina/naloxone) o con farmaci glucorticoidi per via inalatoria (ad es. budesonide, fluticasone) si raccomanda un attento monitoraggio delle possibili reazioni avverse*

