

# IMATINIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per leucemia mieloide cronica (LMC), leucemia linfoblastica acuta e altre malattie del sangue. Ciascuna capsula rigida contiene 100 mg di principio attivo (imatinib).

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei.



## COME SI PRENDE?

Le capsule di imatinib devono essere ingerite intere.

**Non frantumare né sciogliere le capsule a meno che non ci siano difficoltà ad ingoiare.**

**Assuma imatinib a stomaco pieno.**

- **Se non è in grado di deglutire le capsule, può aprirle e versare la polvere in un bicchiere d'acqua non gassata o di succo di mela.**
- **Ingerire immediatamente la soluzione, raccogliendo eventuali residui rimasti nel bicchiere con un po' di acqua o succo di mela.**

**Lavi le mani immediatamente dopo l'apertura.**

## E SE NE DIMENTICO UNA?

SE DIMENTICA UNA DOSE, LA PRENDA APPENA POSSIBILE.

Tuttavia, se ricorda di assumere le capsule poco prima della dose successiva, salti la dose dimenticata, quindi continui con il dosaggio normale.

**MA ATTENZIONE!!!**  
**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.**

Limitare il più possibile l'uso di paracetamolo (TACHIPIRINA®) perché potrebbe aumentare il rischio di epatotossicità.

Se è in terapia con Coumadin® potrebbe aumentare il rischio di sanguinamento.

L'utilizzo di domperidone (es. Peridon®) può aumentare il rischio di problemi cardiaci.

E' possibile che alcune sostanze naturali interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Pompelmo, iperico, mela cotogna, ginseng, acido alfa-lipoico, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, carbone attivo, aloe, cascara, echinacea, ginkgo, quercetina, eucalipto, glucomannano, aglio (non per impiego occasionale ad uso alimentare), lime e arance amare (frutto o succo), bevande alcoliche e caffè, artiglio del diavolo e liquirizia.

## EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono: ritenzione idrica ed edema, nausea, diarrea, vomito, bruciore di stomaco, dolori addominali, reflusso gastroesofageo, stitichezza, sudorazione notturna, reazioni di fotosensibilità, dolore muscoloscheletrico, insonnia, cefalea, capogiri, alterazioni del gusto, secchezza oculare, offuscamento della visione, aumento della lacrimazione, vampate, sanguinamento, tosse, affaticamento, febbre, brividi, variazioni di peso.

### ALCUNI CONSIGLI?

#### SECCHENZA CUTANEA ED ERITEMI

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
- Utilizzi prodotti solari schermanti.
- Idrati sempre le parti con una crema apposita almeno due volte al dì.

Per avere informazioni più dettagliate sulla gestione degli effetti collaterali più comuni faccia riferimento al libretto generale su

### "LA TERAPIA ONCO-EMATOLOGICA ORALE".



Se nota effetti, quali: veloce aumento di peso, dolore toracico, tosse, segni di infezioni quali febbre, brividi intensi, faringite, comparsa di bolle o ulcere sulla mucosa della bocca, comparsa di lividi, sangue nell'urina o nelle feci, eruzioni cutanee, arrossamento cutaneo con vesciche sulle labbra, occhi, pelle e bocca contatti subito il suo medico di riferimento.

#### CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

## MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Prestare cautela quando si somministra imatinib con inibitori delle proteasi, antifungini azolici, alcuni macrolidi, substrati del CYP3A4 con una ristretta finestra terapeutica (es. ciclosporina, tacrolimus, ergotamina, fentanyl, chinidina) o warfarin.*
- *L'uso concomitante di imatinib e di medicinali che inducono il CYP3A4 (es. desametasone, fenitoina, iperico) può ridurre significativamente l'esposizione a imatinib.*
- *Nei pazienti tiroidectomizzati in trattamento sostitutivo con levotiroxina monitorare attentamente i livelli di TSH.*
- *Effettuare regolarmente un conteggio ematico completo e monitorare la funzione epatica e renale.*
- *Monitorare il peso dei pazienti a causa della possibilità di grave ritenzione di fluidi.*
- *Monitorare i pazienti con malattia cardiaca o con fattori di rischio per l'insufficienza cardiaca.*
- *Testare i pazienti per l'infezione da HBV prima di cominciare il trattamento per possibile riattivazione del virus.*
- *Raccomandare attenzione durante la guida di veicoli per la possibile comparsa di capogiri e sonnolenza.*

