

MIDOSTAURINA (RYDAPT®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per la leucemia mieloide acuta (LMA) e la mastocitosi sistemica aggressiva.

Ciascuna capsula di Midostaurina contiene 25 mg di principio attivo.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata inizialmente per la LMA è 50 mg di midostaurina 2 volte al giorno; per la mastocitosi è 100 mg 2 volte al giorno. Le dosi successive verranno prescritte sulla base dell'efficacia e della tolleranza al farmaco.



COME SI PRENDE?

Le capsule di Midostaurina devono essere ingerite intere.

I pazienti non devono frantumare né sciogliere le capsule. La Midostaurina può essere assunta con o senza cibo.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Midostaurina prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio

**MA ATTENZIONE!!!
NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO !**

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque
altro medicinale, chiedi sempre
consiglio al Suo medico.**

L'uso di Rifampicina può diminuire l'efficacia del farmaco.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI
LIMITARE L'USO DI:**



Bevande alcoliche, pompelmo, iperico, mela, carbone attivo, arancio amaro, boldo, cassia, uncaria, artiglio del diavolo, echinacea, eucalipto, berberina, partenio, aglio, ginkgo biloba, thè verde, liquirizia, lime, quercetina, trifoglio rosso, riso rosso fermentato, resveratrolo, curcuma, valeriana, vitamina A, Vitamina E, glucomannano, aloe.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono infezione delle vie respiratorie superiori, riduzione dell'appetito, insonnia, mal di testa, capogiri, pressione elevata, tosse, diarrea, vomito, stitichezza, nausea, eruzione cutanea, pelle secca, dolori muscolo-scheletrici, affaticamento, febbre, accumulo di liquidi a livello delle braccia e/o delle gambe.

Se nota effetti quali:

infezione polmonare, forte dolore allo stomaco e alla schiena, febbre, debolezza, capogiri, affaticamento, sanguinamento, comparsa di lividi, vampate, arrossamento, rossore del volto, difficoltà respiratorie, difficoltà nel parlare o nel muoversi, sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe o delle braccia, estremità degli arti fredde, contatti subito il suo medico curante.



**In caso di comparsa di
NAUSEA e/o VOMITO,
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale
su "la terapia onco-ematologica orale".**

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Prima di iniziare il trattamento con midostaurina si deve valutare il profilo cardiovascolare del paziente.*
- *Per gestire le tossicità ematologiche e non ematologiche, devono essere considerate modifiche della dose o interruzioni del trattamento.*
- *Si deve considerare la riduzione aggiustamento della dose se in terapia concomitante con forti inibitori del CYP3A come claritromicina, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo, nefazodone, ritonavir, saquinavir, voriconazolo, succo di pompelmo...*
- *E' controindicato il trattamento con induttori del CYP3A4 (carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifabutina, rifampicina e erba di San Giovanni) durante la terapia con Midostaurina.*
- *Per i pazienti con compromissione renale lieve o moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose.*
- *Reazioni avverse come disturbi della vista, capogiri, sonnolenza e stanchezza sono state associate con Midostaurina. Pertanto, si deve raccomandare cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari.*

