

# NILOTINIB (TASIGNA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato in pazienti adulti e pediatrici con LMC di nuova diagnosi o in pazienti con LMC resistenti od intolleranti a precedente trattamento. Ciascuna compressa rivestita di Nilotinib contiene 150 mg o 200 mg di principio attivo.

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata nei pazienti con LMC di nuova diagnosi è 600 mg. Pazienti resistenti od intolleranti a precedente trattamento per LMC: la dose raccomandata è 800 mg al giorno.



## COME SI PRENDE?

Le compresse di Nilotinib devono essere ingerite intere.

**I pazienti non devono frantumare né sciogliere le compresse. Tasigna non deve essere assunto con cibo (almeno 2 ore dopo aver mangiato o 1 ora prima di mangiare).**

**E POI...**

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

### **E SE NE DIMENTICO UNA?**

Se si è dimenticato una o più dosi di nilotinib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

**MA ATTENZIONE!!!  
NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.**

L'uso di Warfarin e altri anticoagulanti potrebbe aumentare il rischio di sanguinamento.

Farmaci con attività sul cuore come gli antiaritmici o farmaci usati nel trattamento delle infezioni potrebbero interferire con Tasigna, informi il medico se le sta assumendo.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Birra, vino, mela cotogna, succo di pompelmo, erba di San Giovanni, prodotti a base di arsenico, cesio, consolida maggiore, efedra, sida cordifolia, frangula, acido tannico.

Succo di pompelmo, arancia rossa, erba di san giovanni e succo di carambola vanno evitate.

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono mal di testa, stanchezza, dolore muscolare, prurito, eruzione cutanea, nausea, caduta dei capelli, dolore muscolare, dolore alle estremità, dolore alle articolazioni, dolore alle ossa e dolore spinale dopo l'interruzione del trattamento con Tasigna, infezioni del tratto respiratorio superiore. Se manifesta in modo grave uno di questi effetti, informi il medico.

**In caso di comparsa di  
NAUSEA e/o VOMITO,  
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI  
faccia riferimento al libretto generale  
su "la terapia onco-ematologica orale".**

Se nota effetti quali:  
dolore o fastidio al petto, improvvise palpitazioni cardiache,  
svenimento, debolezza muscolare grave o paralisi, convulsioni o improvvise alterazioni del pensiero o del livello di vigilanza,, sensazione di intorpidimento o debolezza, problemi nel camminare o nel parlare, dolore, alterazione del colore o sensazione di freddo in un arto, gonfiore dei piedi o delle mani, gonfiore generalizzato o un rapido aumento di peso, contatti subito il suo medico curante.



## CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *L'uso di agenti anticoagulanti deve essere valutato con cautela in pazienti che possono essere a rischio di sanguinamento*
- *Prima di iniziare il trattamento con nilotinib si deve valutare il profilo cardiovascolare del paziente*
- *Per gestire le tossicità ematologiche e non ematologiche, devono essere considerate modifiche della dose o interruzioni del trattamento*
- *è controindicato l'utilizzo di antiaritmici, cloroquina, alofantrina, claritromicina, aloperidolo, metadone, moxifloxacina, ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, claritromicina, telitromicina, ritonavir, - carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, rifampicina, erba di San Giovanni, midazolam, alfentanil e fentanil ciclosporina, sirolimus e tacrolimus diidroergotamina e ergotamina lovastatina, simvastatina warfarin astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil o alcaloidi dell'ergot (ergotamina, diidroergotamina)*
- *inibitori e induttori del CYP3A4*
- *Reazioni avverse come disturbi della vista, capogiri, sonnolenza e stanchezza sono state associate con Nilotinib. Pertanto, si deve raccomandare cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari.*

