

# REGORAFENIB (STIVARGA<sup>®</sup>)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per carcinoma metastatico del colon-retto, tumori stromali gastrointestinali(Gist) ed epatocarcinoma.

Ciascuna compressa di Regorafenib contiene 40 mg di principio attivo.

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata è di 160 mg al giorno (4 cpr). Sono possibili riduzioni di dosaggio a 80 mg al giorno (2 cpr) o schemi che prevedano di aumentare progressivamente il dosaggio in base alla tolleranza.



## COME SI PRENDE?

Le copresse di regorafenib devono essere ingerite intere.

**Regorafenib dev'essere assunto ogni giorno alla stessa ora. Le compresse devono essere deglutite intere, con un po' d'acqua, dopo un pasto leggero.**

**E POI...**

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

## E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di regorafenib continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

**MA ATTENZIONE!!!**  
**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.**

L'utilizzo di Warfarin può aumentare il rischio di sanguinamento.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Iperico (erba di san Giovanni), pompelmo, lime, arancia amara, sotto forma di frutti, succhi o prodotti erboristici/integratori.

Eviti l'assunzione di qualsiasi lassativo . Non assumere echinacea, aglio, ginkgo, pepe nero e bianco, liquirizia, menta, melograno, carbone attivato.

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto potrebbe provocarle dei disturbi. Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona perciò si ricordi di descrivere sempre con cura come si sente al suo oncologo e/o al MMG.

Durante l'utilizzo di Regorafenib alcuni dei seguenti effetti potrebbero risultare più frequenti:

astenia, diarrea, vomito, nausea, reazioni cutanee come rash acneiforme, talvolta con prurito e pelle secca e/o screpolata, perdita di appetito, debolezza, bocca secca, arrossata o dolorante

Se nota effetti quali:

dolore osteoarticolare, reazione cutanea mano-piede, astenia/affaticamento, diarrea, riduzione dell'appetito e dell'assunzione di cibo, ipertensione e infezione delle vie respiratorie, contatti subito il suo medico curante.



# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Nei pazienti trattati con Stivarga sono state frequentemente osservate alterazioni degli indici di funzionalità epatica, si consiglia dunque di effettuare le analisi di funzionalità epatica (ALT, AST e bilirubina).*
- *Stivarga è stato associato ad un'aumentata incidenza di eventi infettivi.*
- *Stivarga è stato associato a un aumento dell'incidenza di ipertensione arteriosa, ischemia e infarto del miocardio.*

**In caso di comparsa di  
NAUSEA e/o VOMITO,  
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI  
faccia riferimento al libretto generale  
su “la terapia onco-ematologica orale”.**

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

