

RUBRACA (RUCAPARIB)

Il farmaco che sta assumendo è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platinio sensibile di carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta completa o parziale dopo chemioterapia.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata inizialmente è di 600 mg due volte al giorno, equivalente a una dose giornaliera totale di 1.200 mg. Sono previste riduzioni di dosaggio.



COME SI PRENDE?

Le capsule di Rucaparib devono essere ingerite intere.

I pazienti non devono frantumare né sciogliere le capsule.

Il Rubraca può essere assunto con o senza cibo.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di Rucaparib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio

MA ATTENZIONE!!!
**NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO !**

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI
LIMITARE L'USO DI:**



Bevande alcoliche, pompelmo, iperico, mela, carbone attivo, arancio amaro, boldo, cassia, uncaria, artiglio del diavolo, echinacea, eucalipto, berberina, partenio, aglio, ginko biloba, thè verde, liquirizia, lime, quercetina, trifoglio rosso, riso rosso fermentato, resveratrolo, curcuma, vitamina A, Vitamina E, glucomannano, aloe.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto **POTREBBE** provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono stanchezza, nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, riduzione dell'appetito ed eruzione cutanea.



Se nota effetti quali: difficoltà respiratoria, forte dolore allo stomaco, febbre, debolezza, capogiri, **a f f a t i c a m e n t o**, sanguinamento, comparsa di lividi, vampate, arrossamento, rossore del volto, difficoltà respiratorie, difficoltà nel parlare o nel muoversi, sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe o delle braccia, estremità degli arti fredde contatti subito il suo medico curante.

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Si consiglia di eseguire un esame emocromocitometrico completo prima di iniziare il trattamento con Rubraca in quanto è possibile osservare eventi di mielosoppressione (anemia, neutropenia, trombocitopenia).*
- *In caso di co-somministrazione di warfarin e Rubraca si deve prendere in considerazione un ulteriore monitoraggio del Rapporto internazionale normalizzato (INR).*
- *Per i pazienti con compromissione renale lieve o moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose.*
- *E' consigliato un limitato uso di caffeina.*

**In caso di comparsa di
NAUSEA e/o VOMITO,
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale
su "la terapia onco-ematologica orale".**

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

