

# SORAFENIB (NEXAVAR®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il tumore del fegato e per il tumore del rene. Ciascuna compressa di Nexavar contiene 200 mg di principio attivo (sorafenib).

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. Un ciclo completo di trattamento con sorafenib prevede l'assunzione di 4 compresse al giorno, 2 al mattino (400 mg) e 2 la sera (400 mg), per un totale di 800 mg al giorno.

In alcuni casi potranno essere indicate dal medico dosi inferiori.



## COME SI PRENDE?

Le compresse di sorafenib devono essere assunte intere, a stomaco vuoto, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo l'assunzione di cibo.

**E POI...**

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

## E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di sorafenib continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

**MA ATTENZIONE!!!**

**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque  
altro medicinale, chiedi sempre  
consiglio al Suo medico.**

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Iperico (erba di san Giovanni), pompelmo, lime, arancia amara, sotto forma di frutto, succhi o prodotti erboristici/integratori.

Inoltre

**SI RACCOMANDA DI EVITARE**

bevande alcoliche, caffè, cibi molto grassi e/o piccanti e prodotti contenenti principi attivi in forma concentrata come: aglio, pepe nero e bianco, liquirizia, menta, melograno, crusca, semi di lino, carbone attivato, resveratrolo, vitamina C, vitamina E, cascara (non per impiego occasionale ad uso alimentare).

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono ritardati. Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona perciò si ricordi di descrivere sempre con cura come si sente al suo medico.

## ALCUNI CONSIGLI?

### PRURITO E SCREPOLATURE MANI/PIEDI

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
- Utilizzi prodotti solari schermanti.
- Idrati sempre le parti con una crema appositamente almeno due volte al dì.
- Eviti di indossare scarpe strette.

### INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

- Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco
- Faccia risciacqui con colluttori ad azione lenitiva.
- Succhi un pezzo o beva succo d'ananas.

Per avere informazioni più dettagliate sulla gestione degli effetti collaterali più comuni faccia riferimento al libretto generale su

### "LA TERAPIA ONCO-EMATOLOGICA ORALE".



Se ha febbre persistente > 38° C, svenimenti, perdita di peso contatti il suo medico di riferimento.

Durante il trattamento con sorafenib si ricordi di controllare spesso i valori della pressione sanguigna.



# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Possono essere necessarie sospensioni nell'assunzione di alcune dosi in base alla sicurezza e tollerabilità.*
- *La co-somministrazione con induttori/inibitori potenti del CYP3A4 deve essere evitata.*
- *I pazienti devono essere sottoposti a screening per l'ipertensione e controllati in modo appropriato.*
- *Si raccomanda la sospensione temporanea del trattamento in pazienti con grave ipertensione non controllata con trattamento farmacologico.*
- *Nei pazienti che assumono sorafenib devono essere monitorati anche i livelli degli enzimi pancreatici, di fosfato e di calcio nel sangue.*

### CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

