SUTENT®

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST), per il carcinoma renale metastatico (MRCC), per tumori neuroendocrini pancreatici (pNET).
Ciascuna capsula di Sutent può contenere 50 mg, oppure 25 mg, oppure 12,5 mg di una sostanza attiva denominata SUNITINIB.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

- **SCHEMA A**: Un ciclo completo di trattamento con Sutent dura 6 settimane. Nelle prime 4 settimane (giorni 1-28) deve assumere Sutent ogni giorno. Nelle due settimane successive (giorni 29-42) non deve assumere Sutent.
- **SCHEMA B**: Trattamento continuativo con Sutent.

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te

COME SI PRENDE?

Sutent può essere assunto con o senza cibo, con un bicchiere d'acqua.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di sutent continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco nell'organismo.

ASSOLUTAMENTE VIETATI

- Prodotti a base di iperico (erba di san Giovanni),
- Pompelmo, lime, arancia amara, sotto forma di frutti, succhi o prodotti erboristici /integratori.

Inoltre SI RACCOMANDA DI LIMITARE prodotti contenenti principi attivi in forma concentrata (non per impiego occasionale ad uso alimentare) come: aglio, pepe nero e bianco, liquirizia, menta, melograno, crusca, semi di lino, valeriana, acido alfa-lipoico, quercetina, echinacea, berberina, ginkgo, aloe vera, carbone attivato, resveratrolo, vitamina C, vitamina E, cascara.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Come tutti i medicinali SUTENT può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano. Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona perciò si ricordi di descrivere sempre con cura come si sente al suo oncologo e/o al MMG.

ALCUNI CONSIGLI?

ARROSSAMENTI E SCREPOLATURE MANI/PIEDI

- Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
- Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
- Utilizzi prodotti solari schermanti.
- Idrati sempre le parti con una crema apposita.

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

- Eviti cibi acidi, alcol e tabacco.
- Risciacqui con colluttori ad azione lenitiva.
- Succhi un pezzo o beva succo d'ananas.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o ALTERAZIONE DEL SENSO DEL GUSTO DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale.

Se ha febbre persistente >38°C, svenimenti, perdita di peso interrompa l'uso di sutent e contatti il suo medico.

Durante il trattamento con sutent, si ricordi di controllare spesso i valori della pressione sanguigna.

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Possono essere necessarie sospensioni nell'assunzione di alcune dosi in base alla sicurezza e tollerabilità.*
- *La co-somministrazione con induttori/inibitori potenti del CYP3A4 deve essere evitata.*
- *I pazienti devono essere sottoposti a screening per l'ipertensione e controllati in modo appropriato. Si raccomanda la sospensione temporanea del trattamento in pazienti con grave ipertensione non controllata con trattamento farmacologico.*
- *I pazienti devono essere informati che durante il trattamento con sunitinib può verificarsi alterazione del colore dei capelli o della cute.*

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: _____

Farmacia: _____

MMG: _____

rete oncologica
PIEMONTE | VALLE D'AOSTA
si prende cura di te