TALIDOMIDE (THALIDOMIDE CELGENE®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato in per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.

Ciascuna capsula rigida contiene 50 mg di talidomide.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata è 200 mg (4 capsule x 50 mg) al giorno per gli adulti di 75 anni di età e meno, mentre è 100 mg (2 capsule x 50 mg) al giorno per gli adulti di età superiore a 75 anni.

Per i pazienti candidadibili al trapianto autologo (VTD) il dosaggio è suscettibile a variazione, fino alla dose di 50 mg die.

rete oncologica

COME SI PRENDE?

Le capsule di talidomide devono essere ingerite intere.
Non spezzare, aprire né masticare le capsule. Se la polvere di una capsula spezzata di Thalidomide viene a contatto con la cute, lavare la cute immediatamente con acqua e sapone. Prenda la capsula in dose singola prima di coricarsi.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se dimentica di prendere Thalidomide Celgene all'orario abituale e

- sono trascorse meno di 12 ore: assuma immediatamente le capsule.
- sono trascorse più di 12 ore: non prenda le capsule. Prenda le capsule successive, all'orario abituale il giorno seguente.

Eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

se sta assumendo altri medicinali che:

- provocano sonnolenza, poiché talidomide può aumentarne gli effetti come i sedativi (come ansiolitici, ipnotici, antipsicotici, antistaminici H1)
- riducono la frequenza cardiaca come glianticolinesterasici e beta-bloccanti
- sono utilizzati per problemi cardiaci (come digossina) o per fluidificare il sangue (come warfarin)

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Alcuni alimenti e/o bevande possono talvolta interagire con i farmaci. Il medico può consigliare di evitare certi alimenti e/o bevande.

Non faccia uso di alcol durante il trattamento con Thalidomide Celgene.

L' alcol può causare sonnolenza, che può essere potenziata da Thalidomide Celgene.

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono: eritema e secchezza della pelle, mal di testa, capogiri, diarrea, vomito, nausea, neutropenia accompagnata da febbre ed infezioni, affaticamento, stanchezza, febbre, convulsioni, vertigini, vista offuscata.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

Smetta di prendere Thalidomide Celgene e consulti immediatamente il medico se nota

- Gravi reazioni cutanee comprese eruzioni cutanee e comparsa di vesciche sulla pelle e sulla mucosa

Se dopo aver assunto THALIDOMIDE CELGENE nota effetti quali:

- insensibilità, formicolio, disturbi della coordinazione, dolore a mani e piedi.
- improvviso dolore al torace o difficoltà di respirazione; dolore al petto che si irradia alle braccia, al collo, alla mandibola
- sanguinamento

contatti subito il suo medico curante

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *L'uso di agenti anticoagulanti deve essere valutato con cautela in pazienti che possono essere a rischio di sanguinamento: si consiglia l'attento monitoraggio dei valori INR sia durante il trattamento combinato con talidomide-prednisone che durante le prime settimane post-trattamento.*
- *Si raccomanda di sottoporre i pazienti ad esami neurologici e clinici prima di iniziare la terapia con talidomide e di effettuare il monitoraggio standard durante il trattamento.*
- *I pazienti con fattori di rischio noti per l'infarto del miocardio, compresi quelli con precedente trombosi, devono essere monitorati attentamente e si deve intervenire per tentare di minimizzare tutti i fattori di rischio modificabili (ad es., fumo, ipertensione e iperlipidemia).*
- *Il rischio di morte intrauterina o di gravi anomalie congenite, in primo luogo focomelia, è estremamente alto. Talidomide non deve essere mai usata durante la gravidanza.*
- *Particolare cautela è richiesta nel somministrare talidomide in concomitanza a farmaci che inducono sonnolenza.*
- *Reazioni avverse come disturbi della vista, capogiri, sonnolenza e stanchezza sono state associate con Talidomide. Pertanto, si deve raccomandare cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari.*

rete oncologica