

TEMOZOLOMIDE (TEMODAL®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il tumore al cervello.

Ciascuna capsula può contenere 20 mg, 100 mg, 250 mg di principio attivo (temozolomide).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei.

A seconda della dose prescritta, potrebbe essere necessario assumere più di una capsula contemporaneamente, eventualmente con diversi dosaggi.

Può essere prescritta una terapia antiemetica per proteggerla dall'eventuale nausea.



COME SI PRENDE?

Le capsule rigide di temozolomide devono essere assunte a stomaco vuoto, ad esempio almeno 1 ora prima di fare colazione, preferibilmente alla stessa ora. Le capsule devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere aperte o masticate.

Se dopo somministrazione della dose si verifica vomito, non può essere somministrata una seconda dose nello stesso giorno. Se la capsula è danneggiata, eviti il contatto della polvere con la pelle, gli occhi o il naso.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di temozolomide, continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!
**NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO !**

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque
altro medicinale, chiedi sempre
consiglio al Suo medico.**

Durante il trattamento con temozolomide devono essere evitate vaccinazioni perché potrebbero dare luogo ad un rischio aumentato di infezione causate dal vaccino.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco

**SI RACCOMANDA DI
LIMITARE L'USO DI:**



Mela cotogna, acido tannico, Coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, carbone attivo, aloe, cascara, rabarbaro, glucosamina, glutamina, orzo, noce, glucomannano, DMSO (dimetilsolfossido), ratania, crusca di riso, gomma adragante (non per impiego occasionale ad uso alimentare).

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono infezione, herpes simplex, affaticamento, stipsi, nausea, vomito, infiammazioni della bocca, diarrea, dispepsia, iperglicemia, diminuzione di peso, anoressia, ansia, depressione, insonnia, cefalea, disturbi dell'equilibrio, sonnolenza, confusione, vertigini, disturbi della memoria, disturbi della concentrazione, occhi secchi, tosse, infezione delle alte vie respiratorie, secchezza della cute, prurito, alopecia, debolezza muscolare, dolore muscolo-scheletrico, incontinenza urinaria.

Per avere informazioni più dettagliate sulla gestione degli effetti collaterali più comuni faccia riferimento al libretto generale su

"LA TERAPIA ONCO-EMATOLOGICA ORALE".



Se nota effetti come orticaria, respiro affannoso, emorragia incontrollata, convulsioni, febbre, mal di testa persistente, disturbi del movimento, contatti subito il suo medico di riferimento.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- *Per tutti i pazienti che ricevono temozolomide e radioterapia in concomitanza è richiesta una profilassi contro *Pneumocystis jirovecii*. Soprattutto quelli che assumono steroidi, devono essere strettamente monitorati per lo sviluppo di PCP.*
- *Prima di iniziare il trattamento devono essere effettuati i test di funzionalità epatica al basale, per possibile riattivazione del virus dell'epatite B.*
- *Nei pazienti trattati con temozolomide si può verificare mielosoppressione, durante il trattamento deve essere effettuato un attento monitoraggio.*
- *Gli uomini in trattamento con temozolomide devono essere avvertiti di non procreare fino a 6 mesi dopo l'ultima dose e di informarsi sulla crio-conservazione dello sperma prima dell'inizio del trattamento.*
- *I pazienti in cura con temozolomide devono essere informati che questo farmaco può influenzare la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.*