

TIOGUANINA (ASPEN®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per la leucemia acuta

Ciascuna compressa di Tioguanina Aspen® contiene 40 mg di principio attivo (tioguanina).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-25°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E
AL RIPARO DA LUCE E UMIDITÀ.**

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei.

La dose esatta e la durata del trattamento dipendono dagli altri farmaci antitumorali che sta assumendo.



COME SI PRENDE?

Le compresse di Tioguanina devono essere deglutite intere, con acqua, alla stessa ora, preferibilmente senza cibo.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una dose, o se ha vomitato subito dopo averla assunta, non assuma una dose doppia, ma continui secondo il normale schema di trattamento.

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chiedi sempre consiglio al Suo medico.

Durante il trattamento con tioguanina l'uso di Aspirina o prodotti contenenti acido acetilsalicilico dovrebbe essere evitato.

L'assunzione di farmaci per il trattamento della colite ulcerosa (Asacol®, Pentasa®, Dipentum®) può aumentare gli effetti collaterali del farmaco.

E' sconsigliato l'uso di tutti i vaccini durante la terapia con tioguanina.

**ASSOLUTAMENTE
VIETATI**



Integratori alimentari o prodotti erboristici a base di Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum), acido alfa lipolico, vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, glucosamina e N-acetilglucosamina, glutammina, carbone attivo, lassativi naturali (aloe, rabarbaro, cascara..) e prodotti ricchi di mucillagini e fibre.

Inoltre **SIRACCOMANDA DI LIMITARE** pompelmi, lime, arance (frutto e succo), bevande alcoliche, caffè, bevande troppo fredde o troppo calde, cibi piccanti, molto grassi e fermentanti (es. fagioli).

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, perché variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono: nausea e/o vomito, dolore addominale, riduzione dell'appetito, bruciore alla bocca.

ALCUNI CONSIGLI?

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

- Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco;
- Usare spazzolini con setole morbide;
- Faccia degli sciacqui con acqua e bicarbonato tre volte al dì.

**In caso di comparsa di
NAUSEA e/o VOMITO,
DIARREA ED CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale.**



Se nota effetti quali febbre (> 38° C) e brividi, tosse, sanguinamenti o lividi inattesi, comparsa di sangue nelle feci o nelle urine, contatti subito il suo medico curante.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

- Per tutti i pazienti è raccomandato un attento monitoraggio della conta ematica (trombocitopenia e leucopenia) e della funzionalità epatica durante il trattamento.
- Pazienti con sindrome di Lesch-Nyhan (deficienza dell'enzima ipoxantina guanina fosforibosil transferasi) possono essere resistenti alla tioguanina.
- I pazienti con deficienza ereditaria della tiopurina metiltransferasi (TPMT) possono risultare più sensibili al farmaco. Anche la cosomministrazione di farmaci per la colite ulcerosa (olsalazina, mesalazina, sulfasalazina) può incrementare gli effetti avversi della tioguanina.
- L'uso concomitante di busulfan e tioguanina ha dato luogo allo sviluppo di iperplasia rigenerativa nodulare, ipertensione portale e varici esofagee.
- E' sconsigliata l'immunizzazione attiva con vaccini attenuati avendo la tioguanina effetti immunosoppressori.

