

# TRAMETINIB (MEKINIST®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato in monoterapia o in associazione con Dabrafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma, positivo alla mutazione BRAF V600, non resecabile o metastatico o in stadio III dopo resezione completa. E' inoltre indicato in associazione con Dabrafenib è per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato.

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

CONSERVARE IN FRIGORIFERO (2°C - 8°C.)  
FLACONE APERTO: 3 MESI A NON PIÙ DI 30°C.  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei. La dose raccomandata di Trametinib, usato sia in monoterapia che in associazione con Dabrafenib, è di 2 mg 1 volta al giorno. Sono possibili riduzioni di dosaggio (1,5 e 1 mg una volta al giorno)



## COME SI PRENDE?

Le capsule di Trametinib devono essere ingerite intere.

Trametinib deve essere assunto per via orale con un bicchiere pieno d'acqua. Le compresse non devono essere masticate o schiacciate e devono essere prese senza cibo, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto.

E POI...

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!**

## E SE NE DIMENTICO UNA?

Se una dose di Dabrafenib viene dimenticata deve essere assunta solo se mancano più di 12 ore alla dose successiva prevista.

**MA ATTENZIONE!!!**  
**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque  
altro medicinale, chiedi sempre  
consiglio al Suo medico.**

Dabrafenib può diminuire la concentrazione sierica di antivirali contro epatite C. L'associazione è controindicata.

E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



Iperico, vitamina C, vitamina E, acido alfa-lipoico, agar e alginati, carbone attivo, arancio dolce, sostanze ad azione lassativa (es. aloe) e ricche di fibre (crusca di riso).

Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE pompelmi, lime e arance amare (frutto o succo), mele cotogne, bevande alcoliche e caffè.

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono ipercheratosi, cefalea, stati febbrili, artralgia, affaticamento, nausea, papilloma, alopecia, rash cutaneo e vomito.

Se nota effetti quali:  
alterazioni della vista, fotofobia e dolore all'occhio, forte dolore allo stomaco affaticamento, sanguinamento, comparsa di lividi, rossore del volto, difficoltà respiratorie, difficoltà nel parlare o nel muoversi, sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe o delle braccia, estremità degli arti fredde, contatti subito il suo medico curante.



# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

*Trametinib deve essere sospeso definitivamente in pazienti con disfunzione cardiaca ventricolare sinistra di Grado 3 o 4 o riduzione clinicamente significativa della LVEF che non si risolve entro 4 settimane.*

*Trametinib deve essere usato con cautela nei pazienti con compromissione renale severa quando somministrato in monoterapia o in associazione con dabrafenib.*

*Trametinib deve essere sospeso nei pazienti con sospetta ILD o polmonite, compresi i pazienti che si presentano con sintomi e segni polmonari nuovi o che progrediscono, che comprendono tosse, dispnea, ipossia, versamento pleurico, o infiltrati, in attesa di esami clinici. Trametinib deve essere sospeso definitivamente nei pazienti con diagnosi di ILD o polmonite correlate al trattamento.*

**In caso di comparsa di  
NAUSEA e/o VOMITO,  
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI  
faccia riferimento al libretto generale  
su “la terapia onco-ematologica orale”.**

## CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

