

# VANTEDANIB (CAPRELSA®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide (MTC) aggressivo e sintomatico, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico. Esiste in commercio il dosaggio da 300 mg e da 100 mg.

## COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

**A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)  
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

## QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

Il medico prescriverà il regime di trattamento indicato per Lei.

La dose iniziale per un'adulto è 300 mg al giorno. Sono previste variazioni di dosaggio fino a 200 mg e 100 mg al giorno.



## COME SI PRENDE?

Le compresse di vandetanib devono essere ingerite intere, con o senza cibo sempre alla stessa ora. Se si dimentica una dose, questa deve essere assunta **non appena il paziente se ne ricorda. Se ciò avviene a meno di 12 ore dalla dose successiva, il paziente non deve assumere la dose dimenticata.**

**E POI...**

**SI RICORDI DI LAVARE LE MANI  
DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!  
E SE NE DIMENTICO UNA?**

Se si è dimenticato una o più dosi di vandetanib prenda la compressa successiva all'orario consueto ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

**MA ATTENZIONE!!!**

**NON ASSUMA MAI UNA DOSE  
DOPPIA DI FARMACO !**

## POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

**Prima di assumere qualunque  
altro medicinale, chiedi sempre  
consiglio al Suo medico.**

Un appropriato monitoraggio clinico è raccomandato per i pazienti in trattamento concomitante con metformina e vandetanib, poichè tali pazienti potrebbero richiedere una dose più bassa di metformina.

La somministrazione di vandetanib con potenti induttori del CYP3A4 deve essere evitata, in quanto l'azione farmacologica può ridursi fino al 40%. I pazienti in trattamento concomitante con digossina e vandetanib, poichè tali pazienti potrebbero richiedere una dose più bassa di digossina. E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

**SI RACCOMANDA DI  
LIMITARE L'USO DI:**



pompelmo, iperico, mela cotogna, acido tannico, carbone attivo, arancio amaro, aglio, frangula, sambuco, crespino, pepe nero, artiglio del diavolo, lime, quercetina, trifoglio rosso, resveratrolo, valeriana, Vitamina E, glucomannano.

# EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto potrebbe provocarle dei disturbi.

Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo.

I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono alterazione del tracciato ECG, capogiri, rash cutaneo, mal di testa, infezioni del tratto urinario, variazioni importanti di peso, febbre, tosse, respirazione difficile o dolorosa, sibili, dolore al petto durante la respirazione, flatulenza frequente, stipsi, pressione alta.

Se nota effetti quali:

dissenteria, cambiamento del colore dei capelli, ipopigmentazione della pelle, rash esfoliativo, ipertensione, nausea, cefalea, affaticamento, anoressia, vomito, disgeusia, stomatite, diminuzione del peso, dolore, aumento dell'alanina aminotransferasi e aumento dell'aspartato aminotransferasi, contatti subito il suo medico curante.



# MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

*Il trattamento con vantedanib può causare reazioni avverse al medicinale di tipo cardio-vascolare: allungamento del Qtc, attacchi ischemici transitori, ictus ischemico, ischemia miocardica, infarto miocardico.*

*Vantedanib può comportare perforazioni e fistole gastrointestinali.*

**In caso di comparsa di  
NAUSEA e/o VOMITO,  
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI  
faccia riferimento al libretto generale  
su “la terapia onco-ematologica orale”.**

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

