VISMODEGIB (ERIVEDGE®)

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore basocellulare della pelle .

Ciascuna capsula di Erivedge contiene 150 mg di principio attivo (vismodegib).

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella sua confezione originale insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA DI TERAPIA?

La dose raccomandata è di una capsula da 150 mg al giorno.

COME SI PRENDE?

Le capsule di vismodegib devono essere deglutite intere con dell' acqua con o senza cibo.

E POI...

NON ROMPA, NE' APRA O MASTICHI LA CAPSULA, PER EVITARE UN'ESPOSIZIONE INVOLONTARIA AL CONTENUTO

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di vismodegib continui il trattamento secondo lo schema ed eventualmente si rivolga al suo medico per un consiglio.

MA ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE ALTRI FARMACI?

Prima di assumere qualunque altro medicinale, chieda sempre consiglio al Suo medico.

Quando vismodegib è sommministrato con rifampicina, carbamazepina, fenitoina, l'eposizione a vismodegib è ridotta. E' possibile che alcune sostanze naturali, spesso usate per la formulazione di integratori o prodotti erboristici interferiscano con l'azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI LIMITARE L'USO DI:

Pompelmi, lime e arance (frutto o succo), bevande alcoliche e caffè, cibi piccanti, molto grassi e fermentanti (es. fagioli). Eviti l' iperico (erba si San Giovanni), mela cotogna, pepe nero, glucomannano, carbone attivo, lassativi naturali (es. aloe, rabarbaro, cascara…), cibi e prodotti erboristici ricchi di mucillagini o di fibre (non per impiego occasionale ad uso alimentare).

rete oncologica

EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI

Il trattamento che le è stato prescritto POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è detto che questi effetti compaiano in Lei, variano da individuo ad individuo. I disturbi che più comunemente potrebbero verificarsi sono spasmi muscolari, crampi addominali, diarrea, nausea, vomito, costipazione, diminuzione dell' appetito, affaticamento, perdita dei capelli, prurito, alterazioni del gusto e dolore alla bocca, assenza del ciclo mestruale, dolore alle estremità.

AVVERTENZE SPECIALI

Per donne in età fertile:

Vismodegib può causare malformazioni congenite gravi. Non deve iniziare una gravidanza durante l'assunzione di vismodegib e nei 24 mesi successivi all'assunzione dell' ultima dose. Deve adottare 2 metodi contraccettivi raccomandati. Non deve allattare durante il trattamento e nei 24 mesi successivi all'assunzione dell'ultima dose del medicinale.

Per gli uomini:

Deve sempre adottare misure contraccettive efficaci anche se ha rapporti sessuali con una donna in gravidanza per evitare di esporre il feto a rischio teratogeno.

In caso di comparsa di NAUSEA e/o VOMITO, DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI faccia riferimento al libretto generale su "la terapia onco-ematologica orale".

NELLA DONNA VISMODEGIB PUÒ COMPROMETTERE LA CAPACITÀ DI CONCEPIMENTO.

Si rivolga al medico se desidera avere figli in futuro.

Se nota effetti, quali febbre, comparsa di macchie o bolle sulla pelle, sanguinamento dal naso o dalle gengive, comparsa di bolle o ulcere sulla mucosa della bocca, comparsa di lividi, comparsa di sangue nell' urina o nelle feci, comparsa al palmo delle mani o dei piedi di un formicolio o bruciore o gonfiore/vescicole, contatti subito il suo medico di riferimento.

CONTATTI UTILI:

Equipe medico-infermieristica: .....

Farmacia: .....

MMG: .....

MEMORANDUM PER GLI OPERATORI SANITARI

Il personale sanitario deve informare i pazienti delle misure previste dal Programma di Prevenzione della Gravidanza di vismodegib.

- *Le donne devono usare due metodi di contraccettivi, di cui uno altamente efficace e un metodo di barriera durante la terapia e nei 24 mesi successivi all'assunzione dell'ultima dose.*
- *Gli uomini devono usare un preservativo, anche se sottoposti a vasectomia, durante il trattamento con vismodegib e nei 2 mesi successivi all'assunzione dell'ultima dose.*
- *Le donne in età fertile dovranno essere sottoposte a un test di gravidanza, il cui esito sarà convalidato da un medico, nei 7 giorni precedenti l'inizio della terapia e con cadenza mensile.*
- *I pazienti non devono donare sangue durante l'assunzione di vismodegib e nei 24 mesi successivi.*
- *I pazienti di sesso maschile non devono donare il seme durante il trattamento con vismodegib e per i 2 mesi successivi.*

rete oncologica