

ARMANI

Contatti: dr.ssa Maria Pia Brizzi [0119026526](tel:0119026526) brizzi.mariapia@gmail.com

Studio di fase III che valuta il trattamento con Ramucirumab in associazione a paclitaxel come trattamento di mantenimento rispetto alla continuazione di una chemioterapia di I linea in pazienti con cancro gastrico o della giunzione gastro-esofagea HER-2 negativi.

Setting: I linea, trattamento di mantenimento.

Principali criteri di inclusione:

- Diagnosi di cancro gastrico o della giunzione gastro-esofagea non resecabile o locamente avanzato, HER-2 negativo
- In corso di chemioterapia di I linea con una combinazione di fluoropirimidine e oxaliplatino (FOLFOX-4, mFOLFOX-6 and XELOX) per 3 mesi. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento adiuvante con cisplatino/oxaliplatino associato a chemioterapia a base di fluoropirimidine e che hanno avuto una recidiva oltre i 12 mesi dal suo completamento
- Evidenza radiologica di beneficio clinico in seguito all'ultima dose di chemioterapia di I linea (CR, PR o SD secondo RECIST v1.1 in caso di malattia misurabile o assenza di progressione di malattia in caso di malattia non misurabile)