

PERSIAN

Apalutamide e radioterapia stereotassica in pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico a basso carico ormonosensibile

Contatti: Dott.ssa Alessia Guarneri alessia.guarneri@ircc.it

Trattamento: ADT+Apalutamide o ADT+Apalutamide +RT

Criteri di Inclusione:

- Pazienti oligometastatici ormonosensibili, definiti dalla presenza di ≤ 5 lesioni metastatiche non viscerali
- Tutte le lesioni devono essere trattabili con radioterapia stereotassica a giudizio del radioterapista
- I pazienti con recidiva metastatica dopo precedente radioterapia definitiva o prostatectomia radicale saranno inclusi nello studio, premesso che un approccio radicale sulla prostata sia stato effettuato
- La terapia di deprivazione androgenica deve essere stata iniziata ≤ 6 mesi prima dell'arruolamento
- I pazienti devono essere eleggibili per il trattamento con Apalutamide

Criteri di esclusione:

- Presenza di malattia viscerale
- Malattia metastatica ab initio
- Qualsiasi controindicazione all'utilizzo di Apalutamide
- Qualsiasi condizione per la quale, nell'opinione del medico curante, la radioterapia stereotassica non dovrebbe essere proposta o potrebbe essere controindicata