**CARDIONCOLOGIA
2017**

PROGRAMMA

8:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ranolazina: gestione della cardiopatía ischemica e nuove acquisizioni in ambito di cardioprotezione

LA GESTIONE DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
E NUOVE ACQUISIZIONI IN AMBITO DI CARDIOPROTEZIONE
MAURO GIORGI

DISCUSSANT: ANGELO SANTE BONGIO, PATRIZIA RACCA

IPERTENSIONE

TRATTAMENTO

LOGO **GIULIA BENEVOLO**

NISTA **ALBERTO MILAN**

LOGO:

LA TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA **ALESSANDRO BONZANO**

DISCUSSANT: PATRIZIA PREGNO, MARCO SICURO

**1 APRILE
2017
TORINO**

Mauro GIORGI

S.C. CARDIOLOGIA U - OSP. MOLINETTE
CITTA' della SALUTE e della SCIENZA di TORINO

Cos'è la RANOLAZINA ?

Ranolazina: caratteristiche essenziali

- Inibizione della **corrente tardiva di Na⁺**
- **Nessuna interferenza** con parametri emodinamici (FC, PAO)
- **INDICAZIONE**: terapia **aggiuntiva** nel trattamento **sintomatico** dei pazienti con **angina pectoris stabile non adeguatamente controllati** con le terapie antianginose di prima linea **o che non le tollerano**
- **DOSAGGI**: **375 - 500 - 750 mg bid** (“up titration” in 2-4 sett)

Come agisce la RANOLAZINA ?

Membrane potential (mV)

Il normale ciclo di contrazione/rilasciamento dipende in gran parte dall'attività dei **canali Na^+** situato all'interno dei cardiomiociti, attivati nel momento in cui la membrana cell si depolarizza

La **corrente del Na^+** è responsabile della **fase ascendente del potenziale d'azione** e contribuisce alla fase di **plateau**, consentendo la normale attività elettrica cardiaca. Dopo picco, **corrente breve tardiva** (chiusura ritardata)

Contrazione normale del cardiomiocita

- **Influsso di sodio attraverso i canali del sodio**
 - **picco di corrente del sodio**
- **Influsso di calcio attraverso i canali del calcio**
- **Rilascio di calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico**
- **Contrazione**

CARDIOMIOCITA ISCHEMICO

Numerosi canali Na⁺ **non si chiudono** completamente, causando un rilascio patologico e tardivo di ioni Na⁺ e, quindi, un **sovraccarico di Na⁺**: il **PA risulta prolungato** con conseguenti alterazioni ecgrafiche. Lo scambiatore Na/Ca in direzione inversa ➔ **sovraccarico di Ca⁺⁺ sodio-indotto** ➔ **↓rilasciamento**

Ischemia Angina

*I_{Na} rapida in ingresso

↑ *I_{Na} tardiva

Sovraccarico di sodio

Sovraccarico di calcio

Ridotto rilasciamento diastolico

↑ Tensione diastolica della parete

Compressione microvascolare e ipoperfusione

ISCHEMIA GENERA ALTRA ISCHEMIA

TERAPIE ANTI-ANGINOSE CONVENZIONALI

MECCANISMO D'AZIONE DELLA RANOLAZINA

Figure 1. The molecular structure of ranolazine

INIBIZIONE CORRENTE TARDIVA DEL Na^+

MECCANISMO D'AZIONE DELLA RANOLAZINA

Ranolazine: mechanism of action

Hasenfuss G, Maier LS. *Clin Res Cardiol* 2008;97:222-26.
Maier LS. *Cardiol Clin* 2008;26:603-14.

NCX: sodium-calcium exchanger

**Quali trials hanno
validato la
RANOLAZINA ?**

Studi Clinici Principali

MARISA

N=191

**Angina
cronica**

Ranolazina
monoterapia
vs placebo

ERICA

N=565

**Angina
cronica**

Ranolazina vs placebo
in aggiunta ad
amlodipina 10 mg

CARISA

N=823

**Angina
cronica**

Ranolazina
vs placebo
in aggiunta
alla terapia standard

MERLIN-

TIMI 36

N=6560

**SCA
NSTEMI**

Ranolazina vs placebo
in aggiunta alla
terapia standard

5) Chaitman JAMA 2004; 291:303-316 9) Chaitman JACC 2004; 43:1375-82

10) Stone, JACC 2006; 48:566-75 11) Morrow JAMA, 2007; 297:1775-1783

Risultati dei trials

- **Aumento durata esercizio al treadmill (valle e picco)**
- **Più tardiva comparsa di sottoST al treadmill**
- **Riduzione del n° di attacchi anginosi (anche post-SCA)**
- **Riduzione del consumo di TNG**
- **Gli effetti anti-anginosi ed anti-ischemici non dipendono dalle variazioni di PAO o FC**
- **Buona tollerabilità**

Quali controindicazioni alla RANOLAZINA ?

RANOLAZINA: controindicazioni

- **Ipersensibilità** al principio attivo o a qualsiasi degli eccipienti
- **Insufficienza renale grave** (clearance creatinina <30 ml/min)
- **Insufficienza epatica moderata o grave**
- Somministrazione concomitante di **inibitori forti del CYP3A4**
(es. itraconazolo, ketoconazolo, voriconazolo, posaconazolo, inibitori della proteasi dell'HIV, claritromicina, telitromicina, nefazodone, succo di pompelmo)
- Somministrazione concomitante di **antiaritmici di classe Ia**
(*chinidina, disopiramide, procainamide*) o di **classe III**
(*sotalolo, dofetilide*) diversi dall'amiodarone

RANOLAZINA E DIFFERENZE ETA' CORRELATE: EVENTI AVVERSI

	<70 anni			≥70 anni		
	% Placebo (n=420)	% Ranolazina (n=604)	Valore p	% Placebo (n=132)	% Ranolazina (n=231)	Valore p
Qualsiasi EA	31.2	32.1	0.79	32.6	44.2	0.034
Qualsiasi evento cardiaco	8.8	6.3	0.14	1.5	0.9	0.62
Costipazione	1.7	5.5	0.02	1.5	13.0	<0.001
Nausea	1.0	3.5	0.012	0.8	5.2	0.037
Dispepsia	0.7	1.0	0.74	0.8	3.5	0.16
Vertigini	2.1	4.3	0.79	2.3	6.5	0.83
Cefalea	2.4	2.3	1.00	0.8	3.5	0.16
Edema periferico	1.7	1.8	1.00	3.0	3.9	0.78
Astenia	0.5	1.0	0.48	0.8	3.9	0.10

Cosa dicono le Linee Guida ?

GUIDELINES

The image features the word "GUIDELINES" in large, bold, 3D red letters. A magnifying glass with a black handle and a silver frame is positioned over the first letter, "G", making it appear significantly larger and more prominent. The letters are set against a white background and cast a soft, light-colored reflection on the surface below them.

**2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline
for the Diagnosis and Management of Patients With
Stable Ischemic Heart Disease**

A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons

CLASS IIa

- 1. Treatment with a long-acting nondihydropyridine calcium channel blocker (verapamil or diltiazem) instead of a beta blocker as initial therapy for relief of symptoms is reasonable in patients with SIHD (420). (*Level of Evidence: B*)**
- 2. Ranolazine can be useful when prescribed as a substitute for beta blockers for relief of symptoms in patients with SIHD if initial treatment with beta blockers leads to unacceptable side effects or is ineffective or if initial treatment with beta blockers is contraindicated (846). (*Level of Evidence: B*)**
- 3. Ranolazine in combination with beta blockers can be useful when prescribed for relief of symptoms when initial treatment with beta blockers is not successful in patients with SIHD (847,848). (*Level of Evidence: A*)**

2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease

The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology

Documento di consenso
ANMCO/GICR-IACPR/SICI-GISE:
La gestione clinica del paziente
con cardiopatia ischemica cronica
G Ital Cardiol 2016;17(7):529-569

Terapia di prima linea
Betabloccante

sintomi non controllati

Associazione con
Ranolazina

Associazione con
Ivabradina

limitatamente a:
pazienti in RS,
con FC ≥ 70 b/min
e disfunzione VS

Da valutare:

- Calcioantagonisti
- Nitrati LA
- Trimetazidina

controindicazioni
o intolleranza

Terapia di prima linea
Ranolazina

Terapia di prima linea
Ivabradina

limitatamente a:
pazienti in RS,
con FC ≥ 70 b/min
e disfunzione VS

Da valutare:

- Calcioantagonisti
- Nitrati LA

**Che ruolo può avere
la Ranolazina nella
cardioprotezione da
terapie antitumorali?**

EXPERIMENTAL

Ranolazine protects from doxorubicin-induced stress and cardiac dysfunction

Carlo G. Tocchetti , Andrea Carpi, Carmela Coppola, Marika Campesan, Antonella Arcari, Giovanna Piscopo, Maria Gaia Monti, Claudia De Lorenzo, Claudio Arra, Nicola Maurea

Annals of Oncology 25 (Supplement 4): iv53–iv57, 2014
doi:10.1093/annonc/mdu325.16

DOXORUBICIN-CARDIOTOXICITY IS BLUNTED IF RANOLAZINE IS ADMINISTERED AFTER DOXORUBICIN TREATMENT, IN EXPERIMENTAL MODELS

1, C. Coppola², G. Piscopo², D. Rea³, F. Galletta², C. Maurea²,
Maurea⁴
¹Centro di Oncologia Addominale, Istituto Nazionale Tumori – I.R.C.C.S. -
e Pascale, Naples, ITALY
²Experimental Research, National Cancer Institute, Pascale Foundation,
ITALY
³INT Pascale Naples, Naples, ITALY

http://dx.doi.org/10.1124/jpet.113.204057
J Pharmacol Exp Ther 346:343–349, September 2013
Experimental Therapeutics

**Possibile uso “off target”:
Ranolazina come cardioprotezione nella
cardiotossicità di terapie antitumorali**

Treat

Review

Ranolazine in the prevention of anthracycline cardiotoxicity ☆

Francesco Corradi^a, Luca Paolini^a, Raffaele De Caterina^{a, b},

PM414 Ranolazine prevents trastuzumab-cardiotoxicity in experimental models

Nicola Maurea, Carmela Coppola, Giovanna Piscopo, Clemente Cipresso, Domenica Rea, Sabato A. Boccia, Claudio Arra

The INTERACT Study

The Ranolazine to Treat Early Cardiotoxicity Induced by Antitumor Drugs

Ranolazina e cardioprotezione: le evidenze sperimentali in attesa dei risultati dei trials clinici

European Journal of Heart Failure (2014) 16, 358–366
doi:10.1002/ejhf.50

Ranolazine protects from doxorubicin-induced oxidative stress and cardiac dysfunction

**Carlo G. Tocchetti^{1*}, Andrea Carpi², Carmela Coppola³, Cristina Quintavalle⁴,
Domenica Rea⁵, Marika Campesan², Antonella Arcari⁷, Giovanna Piscopo³,
Clemente Cipresso³, Maria Gaia Monti⁶, Claudia De Lorenzo⁴, Claudio Arra⁵,
Gerolama Condorelli⁴, Fabio Di Lisa², and Nicola Maurea³**

¹Clinica Montevergine, Mercogliano (AV), Italy; ²Department of Biomedical Sciences and CNR Institute of Neuroscience, University of Padova, Padova, Italy; ³Division of Cardiology, National Cancer Institute, Pascale Foundation, Naples, Italy; ⁴Department of Molecular Medicine and Medical Biotechnology, Federico II University, Naples, Italy; ⁵Division of Animal Experimental Research, National Cancer Institute, Pascale Foundation, Naples, Italy; ⁶Department of Translational Medical Sciences, Federico II University, Naples, Italy; and ⁷IRCCS Neuromed, Pozzilli, Italy

Received 31 July 2013; revised 18 November 2013; accepted 22 November 2013; online publish-ahead-of-print 6 January 2014

Ranolazina previene la disfunzione ventricolare indotta dalla doxorubicina nei topi

Ranolazina riduce la formazione di ROS indotta dalla doxorubicina nei cardiomiociti

Ranolazina attenua l'incremento del collagene interstiziale e la morte cellulare cardiaca indotta dalla doxorubicina

Ipossia e disseminazione metastatica in vivo

Modified from Brahim-Horn M, et al. Biochem Pharmacol 2007; 73: 450-7

Persistent Current Blockers of Voltage-Gated Sodium Channels: A Clinical Opportunity for Controlling Metastatic Disease

Mustafa B.A. Djamgoz^{1,2,*} and Rustem Onkal^{1,2}

Hormones, growth factors, cytokines, hypoxia etc.

$I_{Na} \uparrow$	(Nav1.5, Nav1.7, ENaCa, ENaCg, ASIC1)
$I_K \downarrow \uparrow$	(KCa1.1, Kv1.3, KCa3.1, KCa2.3, GIRK1)
$I_{Cl} \uparrow$	(ClC-3)
$I_{Ca} \uparrow$	(Cav3, TRPV1, TRP?, SOC: Orai1/SIM1)

Invasion / metastasis

Cancer	VGSC α Subtype(s)
Cervix	Nav1.6
Ovary	Nav1.5
Colon	Nav1.5
Breast	Nav1.5 (Nav1.7)
Prostate	Nav1.7 and Nav1.6

- Up-regulation di isoforme del canale del Na voltaggio dipendente (VGSC) in varie forme di carcinoma metastatico

- L'iperattività di VGSC incrementa l'invasività tumorale.

Ipossia, blocco del canale del Na⁺ ed invasione tumorale

Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery, 2013, 8, 66-8

Quali possibili utilizzi pratici della Ranolazina?

RANOLAZINA e CARDIOPROTEZIONE

- Riduzione dell'EF
- Disfunzione diastolica
- Aumento TnT-I e/o BNP
- Riduzione dello strain
- “Re-challenge” dopo fluoropirimidine
- CT/RT in CAD nota (rivascolarizzata o no)
- Prima di fluoropirimidine in soggetto con FRC
- TKIs (es nilotinib, ponatinib)

Grazie per l'attenzione !