

## Elenco indicatori di ESITO per patologia

| PATOLOGIE TUMORALI            |                  | INDICATORI DI ESITO   | Cod. |
|-------------------------------|------------------|---|------|
| GINECOLOGICI                  | COLLO DELL'UTERO | 1) % di complicanze G3 e G4 vaginali , rettali o urinarie documentate alle visite di follow up dopo radioterapia a 12 e a 24 mesi                                   | 11.4 |
|                               |                  | 2) % di pazienti con interessamento dei margini di resezione all'esame istologico dell'intervento chirurgico eseguito con intento curativo                          | 11.5 |
| TESTA e COLLO                 |                  | 1) % di pazienti sottoposti a intervento chirurgico in stadio I con tracheostomia precauzionale   | 1.6  |
|                               |                  | 2) % di pazienti con persistenza della cannula documentata alla visita di follow up a 6 mesi dall'intervento chirurgico, nei casi che hanno richiesto tracheostomia | 1.7  |
| TIROIDE E ghiandole ENDOCRINE |                  | 1) % di casi di pazienti con ipoparatiroidismo diagnosticato alle visite di follow up post chirurgico   | 19.4 |
|                               |                  | 2) % di pazienti con paresi ricorrente diagnosticata alle visite di follow up post chirurgia (follow up a un anno)  | 19.5 |
| UROLOGICI                     | RENE             | 1) % di pazienti operati con metodo "NEPHRON SPARING" rispetto al totale degli interventi chirurgici effettuati nei casi T1   | 16.5 |
|                               | PROSTATA         | 1) % di pazienti che necessitano di pannoloni alla visita di follow up ad un anno dalla prostatectomia  | 14.3 |
|                               |                  | 2) % di pazienti con proctite G3 – G4 dopo radioterapia, documentata alla visita di follow up ad 1 anno   | 14.4 |
| EMATOLOGICI                   | LEUCEMIE ACUTE   | 1) % di pazienti suddivisi per età inferiore o superiore ai 65 anni deceduti a causa della chemioterapia di induzione   | 23.3 |
|                               | MIELOMI          | 1) % di pazienti candidati a terapia curativa non eleggibili al trapianto che hanno discontinuato la terapia di I linea per evento avverso (esclusa progressione)   | 22.3 |