



All'incontro del gruppo di studio sui **tumori urologici** tenutosi in data **29 novembre 2017** erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano

A.O.U. Maggiore della Carità Novara

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Biella

ASL CN 2

ASL Novara

ASL TO 3

ASL Città di Torino (Ex ASL TO 1 e ASL TO 2)

ASL TO 4

ASL Vercelli

ASL VCO

AUSL Valle d'Aosta

Humanitas Gradenigo

IRCCS Candiolo

L'incontro del Gruppo di Studio dei Tumori Urologici del 29 novembre 2017 è iniziato regolarmente alle ore 14.30.

E' presente all'incontro il dott. Gianfranco Ferrero (Rete Oncologica).

In riferimento alla patologia prostatica i partecipanti del Gruppo di Studio vengono informati circa la risposta del Direttore della Rete. Il dott. Bertetto ribadisce che il timing dei 30 giorni è una Direttiva Ministeriale e non della Rete. Su mandato del Gruppo richiederò un appuntamento con il Direttore.

L'OdG prevede unicamente la relazione del dott. Marcello Tucci dal titolo:

La chemioterapia neoadiuvante nel tumore della vescica muscolo-invasivo e l'immunoterapia nel trattamento dei tumori del rene.

Prima di procedere con l'intervento programmato, la Prof.ssa Ruo Redda introduce 2 importanti trial clinici di fase III sul carcinoma della prostata metastatico pubblicati sul NEJM del 2017 denominati STAMPEDE e LATITUDE ([N Engl J Med. 2017 Jul 27;377\(4\):338-351. doi: 10.1056/NEJMoa1702900. Epub 2017 Jun 3.](#) ***Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy.*** [James ND¹](#), [de Bono JS¹](#), [Spears MR¹](#), [Clarke NW¹](#), [Mason MD¹](#), [Dearnaley DP¹](#), [Ritchie AWS¹](#), [Amos CL¹](#), [Gilson C¹](#), [Jones RJ¹](#), [Matheson D¹](#), [Millman R¹](#), [Attard G¹](#), [Chowdhury S¹](#), [Cross WR¹](#), [Gillesen S¹](#), [Parker CC¹](#), [Russell JM¹](#), [Berthold DR¹](#), [Brawley C¹](#), [Adab F¹](#), [Aung S¹](#), [Birtle AJ¹](#), [Bowen J¹](#), [Brock S¹](#), [Chakraborti P¹](#), [Ferguson C¹](#),



[Gale J¹](#), [Gray E¹](#), [Hingorani M¹](#), [Hoskin PJ¹](#), [Lester JF¹](#), [Malik ZI¹](#), [McKinna F¹](#), [McPhail N¹](#), [Money-Kyrle J¹](#), [O'Sullivan J¹](#), [Parikh O¹](#), [Protheroe A¹](#), [Robinson A¹](#), [Srihari NN¹](#), [Thomas C¹](#), [Wagstaff J¹](#), [Wylie J¹](#), [Zarkar A¹](#), [Parmar MKB¹](#), [Sydes MR¹](#); [STAMPEDE Investigators](#) ----- *N Engl J Med.* 2017 Jul 27;377(4):352-360. doi: 10.1056/NEJMoa1704174. Epub 2017 Jun 4. **Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer.** [Fizazi K¹](#), [Tran N¹](#), [Fein L¹](#), [Matsubara N¹](#), [Rodriguez-Antolin A¹](#), [Alekseev BY¹](#), [Özgüroğlu M¹](#), [Ye D¹](#), [Feyerabend S¹](#), [Protheroe A¹](#), [De Porre P¹](#), [Kheoh T¹](#), [Park YC¹](#), [Todd MB¹](#), [Chi KN¹](#); [LATITUDE Investigators](#)).

Il disegno dei trial ed i risultati vengono esposti dal dott. Tucci.

La relazione è stata molto apprezzata ed ha fornito ai presenti numerosi spunti di discussione e di confronto fra i vari specialisti afferenti al GdS.