Corso FARMACI ANTIBLASTICI

Torino 24 gennaio 2025

Le fasi di studio di un nuovo farmaco

B BRUNO

*Division of Hematology – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino and
Department of Molecular Biotechnologies and Health Sciences, University of
Torino – Torino- Italy*

SVILUPPO DEL FARMACO E APPLICAZIONE CLINICA: LE DIVERSE PROSPETTIVE

Fasi e costi dello sviluppo di un farmaco

Come nasce l'idea di un trial

L'iter registrativo

Immissione in commercio del farmaco

La prospettiva del clinico

Normative e bioetica

FATTORI CHE
INFLUENZANO IL
PROCESSO DI
SVILUPPO DI UN
NUOVO
FARMACO

DISCOVERY

Ricerca preclinica

Ricerca clinica

Il farmaco è disponibile

Approvazione

La Sperimentazione

8000-10.000 nuove entità chimiche individuate ► solo pochissime avanzano nello sviluppo ► 1 entra in commercio

Dall'idea di un nuovo farmaco all'ingresso sul mercato sono necessari circa 10-15 anni
Costo totale ≥ 1.000.000.000 di euro

Il processo di Ricerca & Sviluppo.

Da hit a candidato farmaco
Scoperta di nuovi composti bioattivi (hits)
Valutazione e validazione biochimica e farmacologica (hit
to lead)
Ottimizzazione strutturale del lead

FASE DI RICERCA

Schema delle fasi di sperimentazione precedenti l'immissione in commercio di un farmaco

Sperimentazioni cliniche di fase I

OBIETTIVI

- Tollerabilità nell'uomo
- Dati di farmacocinetica e farmacodinamica
- Schema di dosaggio da impiegare nella fase II

SOGGETTI

- Da 20 a 80 volontari sani (o pazienti in caso di farmaci ad alta tossicità)

CENTRI

- Altamente specializzati autorizzati dall'AIFA

DURATA

- 1-2 anni

Sperimentazioni cliniche di fase II

OBIETTIVI

- Definizione della efficacia e tollerabilità nei pazienti
- Individuazione del rapporto dose/effetto

SOGGETTI

- 100-300 pazienti, ma anche fino od oltre 1000

DURATA

- 1-2 anni

METODOLOGIA

- sia studi comparativi che non comparativi
-

Sperimentazioni cliniche di fase III

OBIETTIVI

- Acquisizione di dati di efficacia e tollerabilità su un ampio campione
- Verifica del significato clinico delle interazioni farmacologiche prevedibili
- Definizione finale del rapporto dose/effetto

SOGGETTI

- 1000-3000 pazienti, ma anche fino od oltre 5000

DURATA

- 3-4 anni

Criteri
fondamentali per
una corretta
sperimentazione
clinica sui
farmaci

- Presenza di un gruppo di **controllo** (miglior farmaco già esistente o in sua mancanza il placebo)
- **Randomizzazione** dei pazienti (assegnazione casuale): che è il metodo migliore per ottenere gruppi confrontabili (simili tra di loro)

L'utilizzo del placebo potrebbe essere preferibile in alcune situazioni ad esempio quando si vogliono chiarire aspetti di safety, ovviamente si deve valutare attentamente l'aspetto etico di privare pazienti del trattamento farmacologico.

L'obiettivo è verificare in laboratorio il maggior numero possibile di caratteristiche positive e negative di un farmaco

La fase di Sviluppo preclinico richiede da 2 a 3 anni e costituisce il 30% dell'investimento totale

Sperimentazione preclinica di Fase I e di Fase II

Abbandono di un farmaco se I risultati non sono promettenti o pericolosi (tossicità, via somministrazione)

INTRODUZIONE

METODOLOGIA

EVIDENZE SPERIMENTALI

DISCUSSIONE

MODELLI IN SILICO

MODELLI IN VITRO

MODELLI SPERIMENTALI

MODELLI IN VIVO

MODELLI EX-VIVO

Che modelli si possono utilizzare?

Farmaco – Medicinale – Prodotto Medicinale

Medicinali di origine industriale

- L'autorizzazione all'immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere rilasciata dall' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall' Agenzia Europea per i medicinali (EMA).
- Per ottenere una autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) il richiedente presenta una domanda alle autorità competenti (AIFA o EMA). La domanda rivolta all'EMA può riguardare soltanto medicinali sottoposti ad una specifica procedura di autorizzazione europea. In questo caso l'autorizzazione è valida per tutto il territorio dell'Unione Europea.

AIFA
Agenzia Italiana del
Farmaco

EMA
European Medicines
Agency

FDA
Food and Drug
Administration

Il percorso per la nascita di un nuovo farmaco

UNITÀ OPERATIVA DI FASE I EMATOLOGICA

Resp. Sara Brighen

Determina AIFA n° 809/2015: Requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I

Autocertificati dal 02/08/2016

Composta da: Ematologia Universitaria + Ospedaliera

SOP

STANDARD OPERATING PROCEDURE

L'Unità di Fase I è strutturata in specifiche SOP che regolamentano le attività svolte all'interno della stessa.

La versione originale firmata viene archiviata e conservata presso la struttura designata.

Tutto il personale può accedere alla versione elettronica delle SOP e dei protocolli attivi tramite un percorso condiviso per la consultazione. Una copia cartacea delle SOP è disponibile in DH e nelle strutture di degenza.

SOP 101

Le SOP:

- Hanno una validità di 3 anni
- **Originali cartacee:**
Armadio Archivio c/o Clinical Trial Office Ema U – 2° piano
- **Elettroniche pdf:**
ZC/Share2/F56/Fasel
Se problemi con la ZC ogni area ha un faldone con copia stampata

SOP 201

L'Organigramma

deve

combaciare con

Delegation Log

studio specifico

O
r
g
a
n
i
g
r
a
m
m
a

- Il ruolo di Sperimentatore Principale può essere assunto dal Direttore di Struttura Complessa o da altri medici inclusi nel riquadro "Medici di Studio" in possesso di adeguata formazione ed esperienza.
- Responsabile del carrello delle emergenze.
- Responsabile delle Apparecchiature.
- Figura di back-up Responsabile Archivio del Sistema di Qualità della Fase I.
- Figura di back-up Responsabile Archivio studio specifico.
- Figura di back-up Responsabile della Formazione.
- Figura di back-up Responsabile delle Apparecchiature.

Courtesy of Dr. Bringham

SOP 201; 206

FORMAZIONE

- **Medici: ALS ogni 4 anni**
- Infermieri: BLS ogni 2 anni
- **CV ogni 2 anni**
- **GCP ogni anno alternando corso online con corso FAD o frontale**
- Certificato IATA per responsabile campioni biologici (cadenza biennale)
- Attestati di corsi di formazione con locandina allegata
- Partecipazione a corsi organizzati per competenza

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- **Job description**
- **Questionario verifica conoscenze attraverso All. 02 SOP 101**

SOP 201

REPERIBILITA' 24h/24h

Linea telefonica riservata all'Unità per urgenza clinica e spostamento campioni biologici in caso di black-out/escursione frigo/freezer c/o Lab Citofluorimetria

Numero: xxxxxxxxxxxx (numero breve xxxxxxxx)

Giorni e orari: **Giorni feriali dalle 17 alle 08**
 Giorni festivi e week-end 24h

Cicalino c/o Sala Medici - COES

Turni reperibilità coincidenti con **Trapianto**

Percorso consultazione protocolli in caso di chiamata di colleghi o di pz:

[ZC/Share2/F56/Fasel/PROTOCOLLI ATTIVI](#)

4 LETTI DEDICATI

2 LETTI COES - RISERVATI ALL'UNITA' DI FASE I

1 Ematologia U – Prof. Bruno

1 Ematologia – Dott. Freilone

STANZA 15 – DAY HOSPITAL

2 LETTI DEGENZA/TRAPIANTO RISERVATI ALL'UNITA' DI FASE I

- 1 Trapianto Ema U – Prof. Bruno – **Stanza n. 3**
- 1 Ematologia – Dott. Freilone – **Stanza n. 18**

Processazione campioni ➡ **Laboratorio di Citofluorimetria** piano terra, Via Genova 3
Laboratori Divisione Universitaria di Ematologia – Prof. Bruno

SOP 202

OGNI LETTO POSSIEDE

Monitor centralizzato con immagini in medicheria

OGNI STANZA POSSIEDE

Telecamera di videosorveglianza **senza registrazione** con immagini in medicheria che non verrà utilizzata seguito di una comunicazione di AIFA

SOP 301

Per emergenza interna: PREMI (2222)

Per emergenza esterna in caso di chiamata al medico reperibile:

- **Urgenza differibile:** da visitare entro le 12-24 h presso il centro, a seconda della gravità delle condizioni
- **Emergenza Immediata:** inviare il pz in PS più vicino contattando il 118 e chiedere di informarlo dove si rechi. Il PS contatta il medico reperibile per ricevere informazioni relative allo studio clinico in cui il paziente è arruolato -> **ZC/Share2/F56/FaseI/PROTOCOLLI ATTIVI**

Medico di Guardia Interdivisionale -> interviene solo in caso di urgenze non differibili, gestite secondo pratica clinica standard, in attesa che rientri in ospedale il medico reperibile

Medico reperibile -> riceverà i codici ID + anno di nascita di tutti i pz arruolati e nominativi + telefono dei medici direttamente coinvolti nella sperimentazione, incluso il Direttore Medico.

SOP 301

Verifica **settimanale** -> **Carrello emergenza** (form aziendale)

Verifica **giornaliera** -> **Defibrillatore**

Simulazione emergenza con rianimatori a cadenza annuale:

COES

Degenza Ematologia

Trapianto Ematologia U

All. 10 Piano dei casi imprevisti per rianimatori

SOP 501

FORM ELIGIBILITA'

Se non previsto dallo Sponsor va creato per ogni protocollo e fatta firmare dal medico che arruola il pz.

SOP 502

RIMBORSI AL PZ

Se previsto dallo Sponsor rimborsi per:

- Trasporto e spostamenti
- Pernottamento

Se attuabili seguire procedura dettagliata in SOP

SOP 801

Laboratori coinvolti:

- Laboratorio Baldi e Riberi - Autocertificato per FASE I
- Laboratorio Divisione Ematologia S.C. Universitaria (Citofluorimetria) -> processazione e spedizione ai laboratori centralizzati
- Laboratorio Anatomia e Istologia Patologica 1U

SOP 404

GESTIONE IMP

TUTTA LA GESTIONE DEL FARMACO IN CARICO ALLA FARMACIA:

Ricevimento, controllo, conservazione, tracciabilità, preparazione IMP, contabilità

ALLESTIMENTO IMP c/o OIRM

L'allestimento avverrà all'OIRM ➡ **SOP AZIENDALE TRASPORTO IMP**

- Lab Citostatici prenoterà autista per consegna farmaci all'OIRM con trasportino+ghiacciolini+temptale (se previsti dallo Sponsor in base alla stabilità del farmaco)
- Preparazione all'OIRM
- Restituzione al Lab Citostatici ➡ controllo integrità farmaco ➡ consegna diretta presso il reparto

Non garantiti consegna/ritiro in urgenza perché il **personale non è dedicato**

SOP 404

Arrivo IMP

Lo Sponsor avvisa tramite e-mail invio IMP ai referenti farmacisti e Study Coordinator -> confermare avvenuta ricezione.

Controllo del farmaco

1. Firma documento "Ricevimento del IMP" e conserva l'originale
2. Trasmettere copia docs di ricevimento + All. 14 SOP 404 Documento di notifica ricezione dell'IMP via fax all'Unità di Fase I
3. Posizionamento IMP c/o
 1. **Armadio** se **temperatura ambiente** presso Farmacia Ospedaliera
 2. **Armadio** se **temperatura ambiente + allestimento** presso Lab Citostatici
 3. **Frigorifero** se **temperatura controllata (2°C - 8°C)** presso Lab Citostaticientro lo stesso giorno lavorativo altrimenti conservazione nel frigo di back-up presso la Farmacia Ospedaliera. Al momento del trasporto dalla Farmacia Ospedaliera al Laboratorio Citostatici l'IMP sarà monitorato tramite Temptale e contenitore idoneo (se richiesto dallo Sponsor)
Grafici temperatura archiviati c/o Lab. Citostatici, faldone "Tracciati temperatura – Unità di Sperimentazione di Fase I"

In caso di **anomalia** comunicazione allo study coordinator archiviazione nel Pharmacy Binder + ISF studio

SOP 404

In caso di **allarme escursione temperatura**:

- farmaco in quarantena
- immediata comunicazione tramite e-mail/fax agli study coordinator per comunicazione allo Sponsor
- Archiviazione c/o Pharmacy Binder Lab Citostatici

Dispensazione farmaco

Se **orale** le farmacisti contatteranno le infermiere per il ritiro e consegna al medico + **All. 16 Modulo tracciabilità IMP**

Se **orale + IV** contatteranno l'infermiere pr il trasporto al reparto + **All. 16 Modulo tracciabilità IMP + Allegato 1 – SOP Trasporto IMP Fase I** dopo consegna farmaco allestito c/o OIRM

Non Conformità (NC)

Tutto il personale in Organigramma è responsabile di segnalare e registrare le NC rilevate

In caso di NC rilevate sui materiali, processi o deviazioni da GCP, SOP e protocollo:

1. Registrare la NC sull'All. 23 Rapporto di Non Conformità
2. Avviare subito trattamento della NC

Una volta segnalata la NC, il QA e il Direttore Medico stabiliscono se intraprendere un'AZIONE CORRETTIVA e/o di verificare gli sviluppi della correzione nel tempo

Farmaci Biologici

Farmaci in Commercio

Bioequivalenza

Biosimilari

Biologico vs. Biosimilare

EFFICACIA

SICUREZZA

EFFICACIA

SICUREZZA

Vantaggi Biosimilari e Biologici

Adapted from @“TeLoSpiego”

CORRESPONDENCE

Check for updates

Cost efficiency and effectiveness of biosimilar filgrastim in autologous transplant

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited 2021

Luisa Giaccone ^{1,2}✉, Lucia Brunello^{1,2}, Jaime Suarez Londono³,
Matilde Scaldaferrì⁴, Marco Cerrano ^{1,2}, Valter Redoglia^{1,2},
Paola Omedè¹, Giuseppe Lia^{1,2}, Massimo Massaia², Dario Ferrero^{1,2},
Federica Cavallo ^{1,2}, Sara Bringhen¹, Sarah Leone⁵,
Francesco Cattel⁴, Tiziana Francisci⁶, Valter Tassi⁶,
Andrea Evangelista⁷, Mario Boccadoro ^{1,2} and
Benedetto Bruno^{1,2,3}

¹Division of Hematology, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, University of Torino, Torino, Italy. ²Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Torino, Torino, Italy. ³Division of Hematology and Medical Oncology, Perlmutter Cancer Center, NYU Grossman School of Medicine, NYU Langone Health New York, NY, USA. ⁴Pharmacy, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italy. ⁵Department of Internal Medicine NYU Grossman School of Medicine, New York, NY, USA. ⁶Blood bank and immunohematology, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italy. ⁷Unit of clinical epidemiology, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, University of Torino, Torino, Italy
✉email: luisa.giaccone@unito.it

WBC and ANC after TX

HB and PLTS after TX

Clinical outcomes

ATMP

I Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata (Advanced Medicinal Products, ATMPs) sono medicine per uso umano basate su geni o cellule. Sono farmaci innovativi per il trattamento di malattie o danni tissutali e possono essere classificati come:

1. Farmaci di Terapia Genica, quando contengono geni;
2. Farmaci di Terapia Cellulare Somatica, quando sono composti di cellule o tessuti manipolati in vitro al fine di cambiarne le proprietà biologiche;
3. Farmaci di Ingegnerizzazione dei Tessuti, quando contengono cellule o tessuti che possono rigenerare o riparare dei tessuti umani;
4. ATMPs combinati, che contengono uno o più dispositivi medici come parte integrante del farmaco, per esempio cellule poste su supporti inerti.

Cellule CAR-T in Italia (update 2024)

Prodotto	Azienda	Indicazioni	Note
Kymriah (tisagenlecleucel)	Novartis	LLA-B refrattaria o in seconda o ulteriore recidiva fino a 25 aa di età DLBCL in recidiva o refrattario in terza linea	DLBCL fino a 75 aa
Yescarta (axicabtagene ciloleucel)	Kyte, Gilead	DLBCL e HGBL in seconda linea DLBCL e PMBCL in terza linea FL in quarta linea	DLBCL, PMBCL e HGBL fino a 75 aa
Abecma (Idecabtagene vicleucel)	BMS	MM in quarta linea	
Breyanzi (lisocabtagene maraleucel)	BMS	DLBCL, PMBCL e FL3B in terza linea	DLBCL e PMBCL fino a 75 aa
Tecartus (brexucabtagene autoleucel)	Kyte, Gilead	LLA-B refrattaria o in seconda o ulteriore recidiva dai 26 anni di età in su MCL in terza linea	
Carvykti (Ciltacabtagene autoleucel)	J&J	MM in seconda linea	NON ANCORA APPROVATO IN ITALIA (trattativa in corso)
Ebvallo (tabelecleucel)	Pierre Fabre	PTLD EBV+ recidivante o refrattaria	Farmaco orfano - Classe H (gennaio 2024)

Terapia genica in Italia (update 2024)

Prodotto	Azienda	Indicazioni	Note
Roctavian (valoctocogene roxaparvovec)	Biomarin	Emofilia A grave (carenza congenita di fattore VIII)	Farmaco orfano - Classe H (gennaio 2024)
Hemgenix (etranacogene dezaparvovec)	SCL Behring	Emofilia B grave e moderatamente grave (carenza congenita fattore IX)	Farmaco orfano - AIC in corso di valutazione AIFA
Durveqtix (fidanacogene elaparvovec)	Pfizer	Emofilia B grave e moderatamente grave (carenza congenita fattore IX)	Richiesta di rimborso non ancora sottomessa
Casgevy (exagamglogene autotemcel)	Vertex	Beta-talassemia trasfusione dipendente e anemia falciforme severa	Farmaco orfano - AIC in corso di valutazione AIFA

Recent Immunotherapeutic Approaches in Multiple Myeloma

Financial toxicity

Patient Journey

Mechanism of Action

CAR enables T cell to recognize tumor cell antigen

Thank you for your attention!!